

結丸散方

完

田口信庵先生撰

古方
兼用丸散方
全

東都

書肆合刺

丸散方序

鑿豈意哉亦有方而已矣鑿之為意也
蓋不得已也其所以不得已者方猶及
闕文矣夫方也者一定不易之謂而不
得人取諸臆也方常一韻古言轉用意
豈可盡哉蓋不得已也方之古術之神
吾誰適後莫尚於張長沙長沙何人史
籍不載今古諸老聚訟不止以余觀之

序

其人存與不存是何傷乎不特長沙盲
傳腐史歷代所識膾炙乎口實者有名
而無實有實而無名亦不可牧舉也竊
以醫藥卜筮一免秦火則宜不為烏有
焉然而方之古術之神長沙獨王長其
間者是何也余故有說焉已矣彼醫意
之言非東漢鑿之語耶加之中鑿之諺
亦西漢史之記也是在其世猶尚然况

百世之下係風捕影乎長沙三經中有
金匱玉函將其自秘帳乎抑亦後進什
襲乎遺弓之公其謂之何人情不遠古
今一也以今測古無隱乎爾知諸魯聖
長沙其然豈其然乎長桑既有禁方道
不虛行長沙待其人亦不可知今而難
折衷不亦宜乎然存羊之福覃及百世
不翅觀於古宋元以降可以擴充斯經

之所繇生也醫聖之稱亦可以弗畔矣
夫夫然故學醫者不可不知本末也方
本也意末也譬諸猶禮之有權也禮之
不知而權豈可為焉乎本立道生非古
而何近世唱古方者取舍不壹各誦張
管蠡以幻惑群小耳食者不識服膺不
移日誤橫目益不勘矣其間目不知一
丁者猶龍斷于一方為疾疾之淵藪也

亡賴者往焉無產者往焉習而不熟自
有肺腸以擬韓康伯也孔艱秉心視人
如豕含珠之報諛言之期易簣之際道
緯之務是以世俗之士側目歸視動輒
曰斃而已者今之所謂古方氏也其蔽
使長沙含冤是誰之愆其飾宋元之餘
唾者與古方氏為仇視也因飾狎陋企
踵縉紳華言巧語聒于俗耳為術賤技

摘疵長沙則大益懼之或狡黠之于阿其所好陰好陽惡傳不習乎勞而無功人見矛盾又是愈懼是識者之所以為大息也余之於刀圭也箕裘之任已為三世九折之方不為不多矣無誓不錄家訓所然足以待萬病矣猶不自是莫不質諸長沙久之熟之古方不必攻擊不必毒藥人以彼似而非者疑長沙乃

吹鑿廢食之倫身方猶及闕文矣其以意為副方丸散數十皆唐宋以下及俗間之方也要不得其道生害於暗投余將以三餘一匡之職事埤益尚未果矣田口信菴篤於鑿者也余初見於淳海菴後屢就謀也益知其心矣今茲著此書來以請序曰予不為曹丘於吾則為皇甫於菴首余閱之正規則審證候願

庸劣之無紕繆故文不雅馴全貴通曉
好生之心可謂勤矣比之畫墁之技徒
疲精於彫蟲遺覆翫於梨棗則固霄壤
也覽者不咎俚言盡心耽思則杏橘於
痼癘亦不出斯與版成書此以贈
享和三年癸亥九月書于穆清樓
東都 岩名展親伯庸題

凡例

一古昔周室之有天下也周公立百官
置醫師職掌疾病是為疾病醫爾來
醫緩醫和長桑扁鵲之後皆脩疾醫
之術以名于當世然非有成書可以
刑於後人者也則其傳泯焉余竊惜
焉及漢興獨仲景氏其所著書雖
以傷寒名家其實百病治方皆備於

斯矣余嘗以為自軒岐而下方至仲
景可謂妙絕古今矣降自魏晉執刀
圭立于世者無慮十數家其能為仲
景者僅可指數夫仲景之為方也
調和氣血發滌水滯非若後世醫方
假名溫補而攻劇也故試諸其毒劇
甚者雖方證相對往往有或不治者
其證四焉一曰毒迫于胸腹而急痛

或平暴欲死者二曰惡毒根于胸膈
而其瘀血聚少腹走發出頭面四支
前後之陰作腫痛腐爛筋骨疼痛者
三曰毒結于胸腹而陳久難治者四
曰水毒留滯于胸腹而及背脚足醫
之雖利瀆有之者是也此四證者其
尤難治者而長沙之方或存或亡乃
用其方亦不委其効者居多焉若然

不取後醫之方不_レ失規則於長沙者
以備此四證則恐亦誤天下蒼生於
是乎今集撰乎自長沙而下歷代諸
家及氏間傳方且余所自試者分_レ之
為四類一曰巴豆劑二曰輕粉劑三
曰大黃劑四曰甘遂劑以此四劑備
彼四證庶幾世醫兼用諸長沙本方
急者救之於緩劇者治之於易然後

四證者可_レ不至危篤矣且詳_レ主治藥
品分量服度以備考證欲無_レ妄施之
誤噫近世醫流不達_レ于此日以誤_レ生
靈者多矣乃至_レ屬_レ續_レ之夕巧言歸_レ咎
命不_レ亦冤乎

一近世之俗畏怖古方醫猶苛令酷吏
至於令人言古方既毒也_レ不可懷也
此非言者之罪也為醫者之罪也蓋

狼疾之徒，稱古方亦不知用丸散之法，妄用謬投，日以賊人，之子世俗之怖職，是之由姑，舉其一，若彼大便閉，則紫圓氣之類是也。夫紫圓氣豈下便之方乎？自有其證耳。夫方證一違，病者遂不起。世俗之怖有由也。夫雖然古醫之能用丸散者，大率秘而不出，間或闕其秘用，以獲奇

効，則亦益什襲之。且所謂秘方者，口受耳傳，不得無且。吾是余之所以有此著也。

一主治藥品分量服度，不必取於本書及傳書也。取之近世諸家及予所自試，而有効者，唯要其經驗効實為眼的者，傍有二三不通者，則於各方下後而訂之，後而註之。

凡謂丸之大小者或曰菟屎或曰彈丸或曰胡麻子梧桐子大小豆某者今皆不用舊說若現在之胡麻子梧桐子大小豆之大也欲易通曉也又曰彈丸大者蓋如枇杷子大也享和二壬戌年六月十四日東武城北千住飛鳥山下之醫田口昂信庵謹書于信庵

兼古
用方
丸散方

東武千住 田口昂信庵集撰

巴豆劑

今用此丸結毒之曰暴厥者皆是其急痛曰下聚于胸腹或有水急以或等丸欲死用茶於本方則可治之也又曰指茶之伍方雖非此例巴豆乃今茲矣

或名
大呂

備急圓

治心腹卒痛或暴厥者曰金匱

字口禁亦須折齒灌云備急二
見之也吾門不云可急日

無也要

巴豆

宋王石曰巴豆不壓油而用之

乾姜

大黃

右三味先擣大黃乾姜為末研巴豆

合散

蜜丸或煉丹酒服之法以暖水

丸或如未差更

紫圓

治胸腹結毒或腹滿不大便或

巴豆

赤石脂

而無

有_レ水氣者_レ千_レ金_レ方_レ日_レ紫_レ田_レ無_レ所

邦唯

赤石脂

俗云

鐵積

作赤

鐵積

錢目

鐵積

代赭

石

也

代赭

氣也

代赭

泄瀉

代赭

也

代赭

也

代赭

也

代赭

也

代赭

也

代赭

右四味先擣代赭石赤石脂為末研

巴豆杏仁合散糊丸服之法如麻子

大人者一二錢五分或十丸為

下小兒者二錢五分或十丸為

令度與少乳汁令下食頃後與少乳勿

巴豆鵝胡菜丸治有蛇蟲而時々心

腹急痛大便閉者上

巴豆五 大黃八 鵝胡菜十 存生

右三味各別末糊丸服之法如梧桐

或重十二丸至五丸

疥癬摺藥疥癬不問新久必打之奇効

巴豆 大黃 葶麻子 黑胡麻 各

分等

右四味細剉麻布包之漬熱酒打之

數一時半時之間如麻疹發肌表也

發而以湯水禁洗如此六七日許而
浴湯則疹白盡愈

輕粉劑

下疳便毒之毒此丸散效之曰痛曰陳
癰疽曰膿汁者皆難解惡毒結身
胸膈而走發腫痛腐爛筋骨疼
後之患若也或下雖用仲景此
痛之治者也今審其証候撰此
等丸散兼用於散之方則雖非

此例已治惡毒
乃今恒于茲也

前七寶丸

毒

治瘡毒骨節疼痛陳痼之

輕粉

也勢可射和製之為者雜雲
也勢可射和製之為者雜雲

雞舌香

二兩雞舌香即丁子也丁子雞

大黃

四兩

即得也

未得也

右五味各別末糊丸

後七寶丸

巴豆 鷄舌香各五兩 大黃八兩

右三味各別末糊丸

凡用七寶丸之法朝服四分晚服四分服之六日至第七日乃服後方丸如前法今立略法其毒輕者七寶丸朝服四分晚服四分凡服之三日

至第四日服後方丸如前法

此治陳方

痼之毒也吾門經驗無雙之方也深求其方也未見祭方中如他病陳痼之毒也方用之則亦能治他病處之毒也方用之則亦能治他病處之毒也凡此劑要計其人小兒強弱量病之輕重宜與者七日輕者四日以湯洗之魚則消浪及紫色云云又旬云

續七寶丸

治用前七寶丸無功者

水銀

三兩

礬石

消石

各六兩

食鹽

兩二

右四味先碎礬石消石乃合四味內
瓦盆中以茗盞覆之以沙築茗盞側
不出其氣案架火上而自下燒之半
日許既而取其所属著茗盞之霜以
棗肉為丸且服之法如七寶丸至第七
法之

生生乳

治肺痿肺癰癰瘰癧諸瘡毒結

胸膈者

水銀

九

礬石

三

寬文年中依嚴
禁人間絕之

故今換或用礬石也見銀山方

硝石

六

礬石

十二

綠礬

八

雲母

五

食鹽

五

青鹽

三

右八味各別擣篩為末以次調合之
內壅中密封之畜積凡十旬以上而
取出燒焉但一燒石藥末二十錢許

燒法丸法如續七寶丸服之法如以

辰砂為一丸或二丸砂為一丸或二丸

梅肉散 治惡毒難解者方曰治

及下疳瘡

輕粉 巴豆各 乾梅肉或鹽梅

非也皆 山梔子各 則能解思肉

也惡 右四味各別末合為散若不能散服

者糊丸亦佳也服之法一或三

送下熱湯

伯州散 治惡毒難發出者見一切打

身瘡疾瘡毒疼痛或諸瘡內膿

反鼻 津蟹津蟹者是河蟹

角石各霜各角石若即

右三味各別搗篩合為散服之法酒

重者
見三卷

與鼎丸

其効同七寶丸而緩又無口中腐爛或瞑眩之患也是用輕粉最上之方也西方友醫所以與鼎之傳方也故自名與鼎丸也

輕粉

入輕粉羊穀柄尖襍魚一口去腸
火丸自下院之下一時詩既而取其於

燒為末十

辰砂

黃礬

大黃

右四味辰砂黃礬大黃各別為末所得之輕粉霜十錢合散糊丸服之法朝服一錢晚服一錢白湯送下十日可以一劑盡不愈則又服之如前法又曰凡用之二三劑而有七寶丸一劑之功矣

龍葵散

治一身發瘡而痒痛或疼痛

者

輕粉

巴豆

各三

龍葵

為霜

修治梅肉散之例

礬黃加輕粉丸

治礬黃散證而胸中

有舊毒惡水不動者

輕粉

巴豆

各五

大黃

礬石

各

如

右四味先大黃礬石各別為末研巴

豆入輕粉糊丸服之法如梧子白湯送下

或名無射

牡蛎角石散

治諸瘡出膿汁者

輕粉

牡蛎

角石

各霜

各

右三味合為散以鷄子白煉粘瘡上

腋臭摺藥

輕粉

蘆眼石

礬石

各

右三味先礬石蘆眼石為末乃合輕粉擦腋下

大黃劑
不今可用此丸散曰效之曰

曰有大便秘不通或難安者皆是其胸間有結胸腹而陳久不散治者於本其証候與此等丸散兼用於本

或名

窮黃散

治轉變不可治者
證轉變者病

大黃
十兩 治瘡及頭上之毒方

芎藭
六兩 芎藭以豐後

右二味各別末合為散
六服之法每服

承氣丸
治腹中堅塊大便不通者

大黃
四兩 治腹滿或燥尿不通者

消石
六兩

丸散

或名
夷則

右二味各別末糊丸子服之每法如梧九

分以二枳實六分厚朴一分黃芩芒硝為丸
即大承氣湯而分大黃芒硝為丸
之病者易飲
使病者則陳久服之病亦唯能易為解也
或唯九而八丸飲服之則
或十唯七丸

浮石丸 治腹中腹中堅塊膿血

者

大黃 赤石脂 浮石兩各四浮石者

石也其味之鹹者真也
火小焦石之流出于河海者鹹也

消石兩四以方有挑仁今

右四味各別末糊丸子服之每法如梧九

一分以二牡丹煎湯服之即大黃牡丹皮子
湯而其例如二兼氣九也或唯九而下
四用之則二十七八九白湯送下

三物浮石丸 治腹不滿其人言我滿

者

大黃 浮石 桃仁各等

右三味各別末糊丸子服之每法如梧十

并昔

湯七送八丸白下ス

三黃丸 治心煩坐起不安大便微利

者一

大黃兩十 黃芩 黃連兩各五

右三味各別未糊丸服之法如梧每服二十

急欲下之則酒服之

或名
夾鐘

硝石大圓 治腹中結毒心下痞鞭者

大黃二十 消石十五 甘艸

人蔘各五

右四味各別為末以苦酒六合先煮

大黃減二合內甘艸人蔘更煮如飴

狀下火乃內消石攪之為丹服之

六一合飲服又日苦酒

耳連大黃丸 治胸間有毒心煩不安

者上

大黃兩六 甘艸 黃連兩各三

或名
林鐘

心文

丸散

右三味各別末糊丸子服之法如梧十

湯送下白

人葭大黃丸 治心下痞鞭大便難者

大黃兩十 黃芩 人參各五

右三味各別末糊丸子服之法如梧十

湯送下白

鐵砂大黃丸 治發黃短氣者

剛鐵砂 蕎麥各三 大黃兩六

右三味各別末合為散水煉酒服之法

法如梧十 以酒服之

礬黃散 治無名惡腫癰風癬瘡者

大黃 礬石各等

右二味各別末合為散白湯送下

薏苡仁圓 治小兒頭瘡及胎毒諸瘡

大人亦得而瘡毒楊梅頭上

粉四分或五分小兒頭瘡胎毒者如

或名
不疑

輕粉一分或二分
全治之不
可不知也

大黃五

土茯苓一

薏苡仁十

右三味各別末煉蜜為丸彈丸大每

服一丸白湯送下日二三

甘遂劑

水今用此丸散丹効之
背胸中皆煩曰腹脹曰下疾曰
背痛者皆是水毒留胸腹而及
難治之醫雖利也候此等丸散丹

或名
姓實

平水丸

治水肿小便不利胸中煩而

喘及下疾者見腫滿不便治者

甘遂

一作二兩一方

漢產充實者為勝今用之

芒硝

芫花各三

商陸四

吳茱萸五

右五味各別末糊丸

服之法如二指
子大飲服二丸

或五
六丸

兼可用於本方
則可治之也

或名
前呂

滾痰丸

治胸中苦煩痰喘者

甘遂

兩二

大黃

兩八

黃芩

兩一

青礞石

兩五

土燒

礞石

之法

燒之

消石

以見

今黃

茶肆

為

萬病

四春

痰

喘

也

金礞石

者當

尤良

也

是功

萬病

四春

痰

喘

也

礞石

者也

右四味各別末糊丸

子服之法

每服二梧桐

加丸

六朝

夕

服之

不

知

又

下

或名
結洗

控涎丹

治痰喘胸中不了了或背痛

者上

甘遂

大戟

白芥子

各等

右三味各別末煉蜜和為丹以生姜

汁湯送下服之法如或曰糊丸亦佳

或名
神呂

如神丸

治腹脹水腫小便不利者

大黃

兩六

牽牛子

甘遂

兩三

一

方

兩三

丸散

十五

右三味各別末糊丸服之法如梧

湯丸白

右四劑總計三十方者誠經驗正實之良方也雖然各方皆峻烈之劑初學之士誤施之則不可謂其害也必審証候藥品分量服度而投之則無病不愈矣庶幾初學之

士卒爾莫投焉切審之切慎之不

雜方

取前四劑外丸二方湯者當能合仲景之規矩可法者而今恒于茲矣

滑石礬甘散

者

治淋瀝小便不利或渴

滑石

肆上飛過者下品或雜以白堊故用之往往有此症而無效者

丸散

是以此方擇細膩白濁無土氣者而用之此方致效驗不可不知也

礬石 各六兩 甘州 三兩

右三味各別末合為散 服之法每服

蝟皮丸 治諸痔漏脫肛腫痛癢痛或

膿血及下血者

蝟皮 八錢 白鷄冠花 十錢 礬石

緣礬 六錢 附子 三錢 生生乳 一錢

右六味各別末有瀉心湯症者以三

黃丸之散末十二錢合之糊丸又有

牡丹皮湯症者以浮石丸之散末十

二錢合之糊丸 服之法如梧子或

白湯送下必自腰至七日愈穴者

或八錢自二三或腰至七日愈穴者

小腰之毒而振云以痛為愈位者也

五物大黃湯 治世俗所謂癰疽者

大黃 芎藭 桂枝 乾地黄

甘草 各六分

右五味以水二合煮取一合羊服之

羊浸指去其膏能治口舌腐爛或牙

齒疼痛者甚奇效成云去大黃一名六物桂枝湯

桃花大黃湯 治有木氣而停滯小便

不利身腫脹者

桃花今年之花不用之

大黃去

右二味以水一合二勺先煮桃花取

八勺去滓內大黃再煎取六勺

甘連大黃湯 治胸間有毒心煩而急

迫者

甘州五分 黃連 大黃各

右三味以水一合二勺先煮甘州取

八勺漬二味須臾絞去滓溫服

黃連解毒湯 治心胸之間有毒而停

滯或心下按之濡而煩悶

或心志不定者

黃連分九

黃芩

大黃

梔子

各六分

右四味以麻沸湯八勺漬之須臾絞去滓温服

千金甘州湯

治服湯藥而嘔逆不入

腹無奈何者十金方嘔吐

甘州三

右一味以水一合五勺煮取八勺服之得吐但服之不吐益佳消息定然後服餘湯即流利便不吐也

鵬胡菜湯

治有臭而吐下見諸證者

鵬胡菜

見一方方曰治吐下時者

大黃

甘州

各等分

右三味以水二合五勺先煮二味取一合去滓內大黃再煎取六勺

一方
加苦楝皮
黃連山椒
作六星

或心志不定者

黃連分九

黃芩

大黃

梔子

各六分

右四味以麻沸湯八勺漬之須臾絞去滓温服

千金甘州湯

治服湯藥而嘔逆不入

腹無奈何者上金方嘔吐

甘州三

右一味以水一合五勺煮取八勺服之得吐但服之不吐益佳消息定然後服餘湯即流利便不吐也

鵬胡菜湯

治有臭而吐下見諸證者

鵬胡菜

見一方方曰治吐下時者

大黃

甘州

各等分

右三味以水二合五勺先煮二味取一合去滓內大黃再煎取六勺

一方
加苦楝皮
黃連山椒
作六星

丸散

診 腹 中 有 塊 以 手 指 頭 按 之 覺 其 塊 青
 白 唇 色 丹 紅 目 下 臉 赤 或 時 煩 時 不
 煩 吐 清 水 或 嘔 沫 又 吐 下 蛇 與 二 三
 餘 得 食 而 嘔 或 不 欲 飲 食 惡 聞 食 具
 心 痛 必 食 祭 作 有 時 者 是 其 候 之 大 概
 也

石膏黃連甘州湯 治心煩而大渴者

石膏五 黃連一 甘州八

右三味以水一合五勺煮取六勺

解毒劑 大小徽瘡家一切必用之

茯苓大 木通大 忍冬大 川芎

中 和大黃中 甘州小 土茯苓

大 右水二合煮取一合分溫二服 加

土茯苓五錢則水四合煮取二合又

加土茯苓十錢則水八合煮取四合

惡湯稠者水煮隨其宜若大劑則水

煮準其方

以上丸二方湯八方也

兼古
用方
丸散方

跂
 長沙氏之教立而二千有餘年矣下是
 唐宋數家得以就緒造其術慶長以還
 李朱之書多來本邦於是刀圭家以
 宋元方書為師而張氏之教殆廢焉近
 來取長沙之方稱古醫方者之徒往往
 出焉觀其所療每方用丸散徒好攻劇
 使病者至於昧々世人畏之如虎狼是

何之謂乎。其由自丸散初學之士。何不
思之甚矣。譬猶隔靴搔痒也。未知仲景
之心事。故曰。醫以丸藥下之。非其治也。
可以見其治矣。今此編則非彼丸散之
謂也矣。則用仲景方不治者。無如之何。
於是乎擇諸名家及民間之方。施病者
有奇而且効者。旁辨藥品之真偽等。以
準的于初學。田信庵與余遊於冢大峰。

之門。志于闕里學。固以醫鳴于東都。
寤寐於長沙之書。精力絕人。夫用之治
術。而治廢愈痼。其補於初學也。弘矣。及
來乞余言。則跋以言其能為有仁之人。
他不及具論云爾。
享和二年壬戌夏五月信州松城侍醫
佐泰明

潤腸丸

潤腸浦卷香枳實仁赤出北山壽庵
室水善原南陽子名是于常用之
主治大便不通之旨也

大黃

三拾分

蕎麥粉 拾分

右二味細末糊丸每服二拾七八丸白湯送下

遠藤八代玄宇記

享和四歲次甲子孟春發行

竹窓亭藏版

江戸橋四日市

竹川藤兵衛

同所

東都書林

西宮彌兵衛

合梓

