



張玉衡書

四

續敘

嘗稽古今醫學備悉萬病獨不明痧因而人鮮其傳
無余世之患者比比也既有此病不可不求有以治
之余因以治之所驗悉其症之由於甲寅歲著玉
衡一書借同人互相叅訂急而行之亦濟生之念所
不得已也書中凡敘痧說似已具詳而年來痧之變
幻更有隱伏於別病中者傷人最多非惟世所罕識
猶余前書之所未及因又有痧刻之續凡以因時所
犯略採異驗為集夫亦謀諸同人非敢以自矜也幸



形用三復言

天下不以多贅而忽者

大清康熙十七年戊午歲季秋吉日郭志遠右陶父

載識

痧脹玉衡全書 後卷

參閱姓氏

曹 峽 扶之

徐來賓 立三

潘大器 象黃

沈原洙 道扶

金 雲 子近

計 旻 著若

王 恒 心一

施 垣 均李

秦 沆 湘侯

袁 祿 丹篋

金履文 敷仲

王 燾 理思

潘汝器 中黃

一計 雯 昂若

唐 珪 雙玉

吳又申 右渾

顧瀾初 硯聲

朱鴻章 圓來

張 昇 方曠

聞大淵 德音

呂 二 思芳斯

參閱玉衡全書

姓氏

痧脹玉衡書後卷目次

徐人越 聖符

駱琦 允文

李琦 勿安

程尚志 枚吉

問維鏞 聲遠

方陳 鼎蓀

曹繼章 傳雲

吳銓 雍簡

金經 權可

金偉 祖翼

沈開愚 德容

劉人傑 天臣

張昊 漢偉

沈學恕 會行

彭彬 松齡

張巖 靜成

弟光華 驥武

男亮勳 端英

痧脹玉衡書後卷目次

痧脹看症法

痧脹痲疹不同辨

痘痲穢觸相同

諸痛類痧辨

論脹

治痧救人脉論

傷風痧脉辨

痧脹舌胎論

放痧辨

痧脹治猶痲疹論

兼痧傷寒不同辨

諸症不類痧辨

凝壅聚結辨

痧筋統說

眩暈痧脉辨

痲疹兼痧脹

痧脹兼麻疹

麻疹後復痧脹

傷寒黃疸兼痧

呃逆痧

自汗盜汗驚惶痧

咽喉諸症兼痧

類瘋痧

翻胃噎膈痧

箭風痧

痧脹類麻疹

麻疹夾痧脹蛔結

痧類陰症

盤腸痧

痧類三瘧

口舌兼痧

黃氣病兼痧

筋骨疼痛痧

久瀉肉瘦痧

婦人隱疾痧

耳痛痧

腫毒夾痧辨

地葡瘟痧

急救逆痘要法

麻木酸痒痧

黃疸痧

驚風痰熱痧

羊毛瘟痧

腳氣痧

手臂痛痧

刺螫瘟痧

痧變發願

癩症兼痧

頭虛足腫痧

小兒夜啼痧

死症痧

痧脹破逆論

痧脹王衡書後卷

痧脹看症法

鶴李郭志遠右陶著

治病須憑脈。若犯痧脹。則脈不對症。症不合脈。或
 痧筋為據。亦惟現外焉。且痧脹有為食積阻滯者。有
 為血痰阻滯者。或阻於上。或阻於中。或阻於下。又或
 阻於左。或阻於右。或阻於兩腰脇。苟非辨症的確。求
 其中病也難矣。故治痧脹。一見脈之不合。先看痧筋。
 大審氣色。三聽聲音。四推犯病之由。其間或有食積

後卷

血痰阻於上中下左右各處之分須細辨其病原後
用藥不誤也凡痧脈有一部獨異有六脈俱異即有
異之中亦有陰陽虛實脈之神氣可辨要非一端可
執尚其審諸

放痧辨

或曰子於痧也有先用藥而放刮者有先放刮而用
藥者非放與刮治更無別法與曰放刮之法猶犯傷
寒太陽經症必用羌活麻黃等藥少陽經症必用柴
胡黃芩等藥症有所犯治有所宜凡氣分有痧宜用

刮血分有痧宜用放此不易之法至臟腑經絡有痧
若昏迷不醒等症非放刮所得治兼用藥療之無足
怪也

痧脹痧疹不同辨

痧疹之發因傷風熱故身體壯熱咳嗽煩悶即是痧
疹之候痧疹在他方有名厝子有名蚤疹在橋李則
名痧子而痧脹亦名為痧不可不辨痧疹因傷風肌
表必虛虛則毒氣乘虛而泄故藥雖或涼仍可用熱
飲若痧脹或因穢氣所感或因暑氣所感或動時行

痧脹
不正之氣。或乘伏寒。伏熱。過時而來。總不起於外傷。風熱。故肌表必實。實則熱毒之氣。既脹於胸腹腸胃之中。若更用熱飲。則熱氣適助其腫脹。無從而泄。故犯此者。有立時脹死。此不可不辨也。

痧脹治論

痧疹之發。必欲盡透。故治痧疹。須要見於肌表者。多則毒氣俱泄。然後腸胃不留餘毒。治痧在肌表者。用刮在血肉者。用放。亦猶治痧疹。須盡透肌表之謂也。

痘疹破觸相同

痘。倉為穢氣所觸。即時作變。痧脹也。痧疹為穢氣所觸。即時反隱。亦痧脹也。若暑氣時行不正之氣。感為痧者。詎無相類者與。

治驗

一陳姓婢。十四歲。四月。壯熱煩悶。腹痛。身重。痲痧。遍體脈微。而細。觸穢之症也。閱腿灣。痧筋。放七鍼。手指放十餘鍼。俱紫黑。毒血煩悶稍愈。用寶花散。阿魏丸。清茶微冷飲之。又付活血順氣之劑。腹痛

痧長玉疔書

後卷

遂止。斑痧漸散，身體輕快。痘即起發，視其形色，已四朝矣。後皆如期，質膿收靨而愈。可見痘中觸穢因痧而隱者，比比也。

兼痧傷寒不同辨

犯傷寒者，有外感三陽之寒，有直中三陰之寒。兼痧者，非可俱兼也。痧者熱毒也，熱毒入裏，內作腫脹，熱毒發外，肌膚腫脹，或升頭面，或散四肢，此等惡疾，俱由熱毒之氣所攻也。若直中三陰之真寒症，無有兼痧者。蓋三陰既已直中，則熱氣為寒氣所拒，無由而入也。至於外感三陽，或先受痧而感寒，或先受寒而感痧，或痧毒驟發，熱極而生寒戰，甚至手足厥冷，則俱有之。若先有痧而感寒者，知其慢痧，方可暫散寒邪。而後治痧。先有寒而感痧者，痧症為重，當先治痧。而後治寒。至如痧毒驟發，熱極而生寒戰，手足厥冷者，緊痧也。若一誤用發散升提溫飲之藥，須防時刻凶危。急用涼水飲之，稍解胸腹中熱脹之氣，然後或刮，或放，用藥治之。

諸痛類痧辨

腹痛不一。有食有氣。有火有冷。有虫有積。俱似痧非。痧不可無辨。食者失饑傷飽。聚中脘作痛。其症遇食即疼。胸膈飽悶。似痧者一。然按脈氣口必然有力。可辨。若因冷食入胃。食與寒氣相搏於中。則心脾鬱結。胸脇滿悶。中脘作疼。似痧者二。然按脈氣口必然無力。但有嘈雜衝胸。噯氣吞酸。可辨氣者。因怒氣所傷。不得發越。胸膈氣塞。衝激心脾。嘔逆惡心。吐不能出。其疼手不可按。坐臥不定。奔走叫呼。似痧者三。然按脈兩關必然洪大。餘部俱必應指。及刮之無痧。痧筋

不現。可辨火者。因熱作痛。胃火上逆。嘔吐酸水。必然口渴。欲飲飲入即吐。其症手足溫暖。面帶陽色。似痧者四。然按脈六部洪數。又與痧類。難以細分。必看痧筋兼用刮法。可辨冷者。久屬虛寒。沉寒作痛。其脈必然平軟。似痧者五。但飲熱則安。飲冷痛發。可辨虫者。胃脘疼痛。有如刀觸。痛極按心。搔爬難定。兼之脈息無倫。徐疾不一。似痧者六。然虫必有因。各有所喜。如茶虫喜食茶葉。糖虫喜食糖物。或泥或絮。或酒或鹽。其爲虫也。必有一好食之。便安。若遇檳榔五靈脂殺。

痢症... 中。等。藥。或。藥。性。力。薄。不。能。驅。逐。而。出。勢。必。咬。齧。翻。動。腸。胃。更。加。疼。痛。可。辨。積。者。舊。有。宿。積。聚。結。腸。胃。忽。因。行。動。作。痛。作。疼。似。痧。者。七。然。痧。筋。罕。現。刮。痧。無。影。可。辨。如。是。辨。之。的。確。方。知。痧。痛。詳。明。治。之。得。法。然。此。諸。痛。又。有。兼。痧。者。將。論。脈。閱。筋。而。加。察。焉。鮮。有。不。得。其。理。矣。

諸症不類痧辨

凡心腹脹痛因痧既知之矣。痧症仍有不痛不脹者。或兼痧或暗痧。誤飲溫熱便致凶危等也。余竊謂凡遇危症。病家不識痧筋。猶用刮痧。可辨醫家或認脈不清。尚有痧筋。可詳若內人不便閱視。果緣痧脹。凶極。脈未有對症者。以是辨之。百不失一也。

論脹

脹者氣之閉也。氣為毒壅。故作腫作脹。所以治痧先當治氣。如食阻其氣於上。則吐之。食壅其氣於中。則消之。食化而結其氣於下。則導之。凡諸積之阻滯。既然。凡下竅閉者。多上吐。或吐蛔。或吐血。當導氣於下。中竅閉則下瀉。或瀉水。或瀉蠶。當行氣於中。上竅閉。

初起則作悶或頭疼或上腫俱當用清涼引下之
而復升則作悶或頭疼或上腫俱當用清涼引下之
至如氣為毒壅必傷血分若乃血為毒凝活血為上
血為毒壅破血為先血為毒聚且結敗血為要故治
痧必兼治血蓋血活毒氣行血破毒氣走血敗毒氣
散如是毒氣不留治斯效也

疑壅聚結辨

疑壅聚結皆血分痧毒惡症其間有輕重之別疑者
初犯之症壅者疑多而壅聚者血壅或左或右結者
血滯一處故痧毒中血分結為重聚次之壅又次之

凝為輕疑以紅花澤蘭為主壅以延胡索桃仁為主
聚以蘇木茜草為主結以五靈脂降香為主輕者用
藥不可重重則恐傷本原重者用藥不可輕輕則治
之不效

治驗

一尹鈞萬咳喉痰喘有以緊勞治之病日增背脊
如弓手足蹇緊不能展動則胸腹百骸弔痛延
余診之脈洪大無倫此毒血壅聚也兼又難別難
放先以圓紅散微冷飲之兩手稍鬆漸為放刮訖

一初則三鬱
九脈主行

又以圓紅散加三七鬱金末微温飲之更以蘇木
茜草為主多加順氣活血之類如前飲之計日放
痧一次者四日用藥一服者五遂痊
一萬君安內室兩脇如痞按之則痛心胃間高起
服藥難療延余左脉微細右脉洪大此慢痧痧毒
結聚也計放痧三次付以五靈脂降香爲主加桃
仁延胡索及消食行氣之類日用一服計十二劑
如舊

一陳弘業寒熱嘔吐苦難俛仰腹中脹痛夜不能

寐六脉弦細而緊數刮放畧鬆用紅花澤蘭劉寄
奴茜草桑寄生併行氣消食之藥微温飲之一劑
而愈

治痧救人脉論

或謂余曰古書所載屋漏雀啄諸怪脉現者或脉代
者或爲五臟有絕也况一部無脉二三部無脉焉得
有生理乎及覽玉衡脉止有六部無脉者或卽諸
怪脉必曰放痧服藥不應者或與古書所載不同何
歟曰古人論此等脉爲次脉者其常也余論此等脉

長玉衡
後卷

一初則曰... 尚當救之者因乎痧之變也凡痧脹之脈都有類諸
久脈者余惟見此疾實隣之真萬有一可救者因痧
之變不執常脈而輕棄之也

治驗

一陳見雅內室懷娠發熱赤痢腹痛不止服他藥
不效余診之脈四動一止代脈也悶有痧筋放
十餘鍼用寶花散微冷服之付以桑寄生益母草
連翹蘇梗紅花金銀花山查葡萄子當歸枳殼青皮
黃芩微冷飲四劑而痊

一張舜瞻側室腹痛嘔痰嘔吐延余脈如彈石知
其患痧痛極脈亦變也令其婢放痧三十餘鍼用
寶花散救苦丹砂仁湯稍冷飲之付以獨活紅花
湯加山查神麴葡萄子青皮微冷飲二劑而愈
一傅純宇發熱昏沉脈如解索先用陰陽水搗辛
芳汁飲之放指臂痧三十餘鍼稍覺清爽用細辛
大黃羌活清茶稍冷飲之付以荆芥銀花湯加青皮
微溫服二劑而痊

一鄒雲公頭面紅腫目閉喉痛六脈無根知其痧

極用三鞭湯
氣阻塞脈路也刺腿足痧四十餘鍼流紫黑血甚

多又刺手臂痧二十餘鍼未愈用清涼至寶飲減
細辛加山豆根射干牛膝石斛桑皮枳殼稍冷飲
三劑而痊

一金子近次子祖翼九月間適因勞動飲食不時
忽壯熱頭痛自以紫蘇湯薰頭而大汗胸中脹悶
他醫用藥下之反口吐白沫時有議以為痧乃更
延醫診視見舌胎灰色以傷寒藥治之子近恐犯
痧氣先以半小鐘試服少頃即譫語片時而止熱

仍不解愈覺沉重脉有八至遂連易三醫皆云傷
寒三次服藥皆昏沉譫語如前第五日眼如火赤
唇若塗硃鼻如煙煤舌胎黑燥枯乾而短聲音不
清足冷至腹陰囊卵縮肉脫神昏醫者皆辭不治
已備後事至七日乃始放痧因病勢危篤止放一
鍼唇眼舌聲諸火症頓愈陰囊二卵漸舒脉竟平
復始現腹痛乃知口渴因惑人言痧症不可服藥
止飲童便服紫金錠而痛止後又隨痛隨服繼進
飲食大便乾結至十八日用蜜導法遂變下痢日

後卷

夜五六十次。九六日始服痧症藥一劑。即安睡。痢乃止。後延他醫調理。補之不數日。睡時即發。遍身水晶痞癩。覺時即隱。醫家莫解其故。子近因刮穿頭額間。痞癩流出。皆汗也。即盜汗不止。他醫咸謂久病虛脫。大用補劑。斂汗不惟無益。更加自汗。且完穀不化。小便短赤。頻數變為砂淋。醫又皆束手。謝事爰復放痧。用八正散二劑。服之。痧氣始轉身。即壯熱約有一更時。身涼汗止。惟日食生茨菇。五六日砂淋亦止。而全愈。祖翼之病變幻。遲久總因

止放二鍼。不服痧症藥。以除根之故也。究以治痧而得全脈。而八至。症雖多。其可棄耶。

一金子近長子。權可八月間發。斑遍身。如麻疹狀。延他醫視之。則曰。癩疹復延。勿科診之。亦云。痧疹服藥十日不退。脈僅一至。醫家因疑其少年鑿喪。故爾虛脫。欲用補劑。子近恐亦痧氣不敢服。命權可起而視之。則遍身痧點。皆活動。流注兩腿。皮肉紅紫。因放腿灣痧一鍼。而皮肉白。又放腿灣痧數鍼。而皮肉皆白。惟小腿紅紫未退。臥即復流動。遍

初用白...
散於身仍作稀稀癩點緣脉尤二至用川烏草烏
為一小丸服之脉復如常大汗出而全愈

痧筋統說

或曰前書放痧有十今放痧者奚不止於此余曰遍
身青筋古有載矣謂放痧有十者不過就痧毒先達
臟腑者明之爾至腿灣痧筋尤人易曉余詳之為初
學者便推而廣之寧有暨乎

傷風痧脉辨

或曰前子傷寒辨痧詳矣若犯痧似傷風何如余曰

肺主皮毛心主血脉肝主筋傷風犯痧三部脉見者居
多且風陽也風傷衛在表故脉浮傷風有汗表虛也
故脉緩有犯此症脉不浮緩反見沉緊或洪大痧脹
一驗也若傷風帶寒鼻塞畏冷脉當浮而微緊脉反
沉伏或芤長痧脹二驗也若傷風熱鼻塞聲重喉痛
脉當浮而微數脉反沉緊或芤或伏痧脹三驗也若
傷風有痰氣急發喘脉當浮滑反微潛沉伏痧脹四
驗也以此推之足矣

治驗

一駱叔源傷風發熱咳嗽痰喘已半月矣左脉沉
伏右脉濇而微數此慢痧爲患也左腿灣放一鍼
紫黑血流至足又刮痧不愈付寶花散加明礬末
稍冷湯飲之用荆芥湯減川芎加蘇子紅花蒲黃
土貝母烏藥微冷飲之而愈

一高允謨傷風鼻塞肩背拘急頭項疼痛有以足
太陽膀胱經藥治之頭頂益痛叫喊不已甚至肩
背沉重時覺昏迷延余治之左寸微伏右關孔大
先服圓紅散稍醒刺腿灣六鍼不愈用寶花散清

茶微冷飲之肩背稍轉頭痛少安詢所服者腹中
覺冷卽用防風散痧湯減枳殼加羌活川芎紫蘇
烏藥溫飲寒散而安

一凌公遜內室傷風喉啞胸腹飽悶兩關俱孔
日扎者痰血未上下俱瘀其痧乎其家人刮之
紫痧甚多飽悶卽解付獨活紅花湯加射干前胡
薄荷石斛連翹玄參二劑微冷飲之傷風喉啞俱
痊

眩暈痧脉辨

一脈用... 氣虛發暈有風中而暈有寒中而暈有勞力而暈今加之以痲暈古人無治古書無論何以知之大都血暈脈扣氣暈脈沉痰暈脈滑火暈脈數濕暈脈濡暑暈脈虛血虛發暈脈濇氣虛發暈脈微風中而暈脈浮緩寒中而暈脈弦緊勞力而暈脈右尺浮洪此暈脈之大略也若病似血暈脈反短似氣暈脈反浮似痰暈脈反濇似火暈脈反遲似濕暈脈反勁似暑暈脈反實似血虛發暈脈反滑似氣虛發暈脈反大似

風中而暈脈反沉緊似寒中而暈脈反微緩似勞力而暈脈反細實是皆脈症不合余歷驗之而信其為痧此痧暈之治不誣也

治驗

一陳肅遠嘗苦發暈醒則日夜頭眩余往候之脈右虛左實徐疾不常余曰此非放痧不可於臆灣上下放十餘鍼紫黑血流如注指上亦放二十餘鍼用寶花散沉香阿魏丸清茶稍冷飲之付防風勝金湯加桃仁紅花稍冷飲之後遂不復患眩暈

一 姜涓瀆內室正月間驟然發暈一日三次舉家
惶恐余見其脉沉而微緊令其婢爲指上放痧二
十餘鍼用救苦丹加沉香末清茶稍冷飲之付荆
芥銀花湯加荀子枳殼一劑而痊
一 梅君玉子三月間吐衄發暈昏沉不醒六脉俱
伏左右虎口脉青色放指頭痧一十八鍼用細梓
大黃丸清茶調黑糖稍冷飲之漸甦付蒲黃飲減
姜黃加陳皮烏藥紅花微冷湯調黑糖飲之乃愈
一 霍庭賢內室四月間壯熱面赤口渴唇焦有以

陽明胃經症藥治之遂發暈終日不醒余診之脉
兩寸弦細兩關沉微兩尺左大右緊曰脉症不合
痧毒內攻也先用蘇木散砂仁湯微冷飲之令其
老婦放指上痧二十餘鍼血色墨黑尤不醒後令
放乳邊痧二鍼乃甦餘症不減用痰藜散微温湯
飲之付桃仁紅花湯加枳殼四劑下盡惡毒黑物
而痊

一 盛思虞六月間飲酒頭汗發暈脉寸關洪大無
倫兩尺脉伏問痧筋放十餘鍼皆紫黑毒血付陳

皮厚朴湯加乾葛山查。荀子微冷飲之。而醒。又用
薑香湯加黃連黃芩乃安。

痧脹舌胎論

或謂全書載痧論治俱備。舌胎僅存其名。豈痧脹舌
胎無可治乎。余曰。非也。蓋謂痧脹有別症之舌胎。則
可謂舌胎即痧脹之症。是不識痧脹之適當其然。併
不識舌胎之所以然也。誠以舌胎乃足陽明胃腑熱
病故治痧脹先理其痧。後治舌胎。即安。若先理舌胎
後治痧脹。則危。蓋舌胎乃胃腑熱極。氣衝心胸。舌為

心苗。故見胎治宜石膏黃連大黃黃芩黃柏之類。若
不先治痧。恐此等藥又寒凝血分。反成大患。故治此
者。要看痧毒一退。即治舌胎可也。

治驗

一翁在茲。發熱口渴。舌有黑胎。臥難轉動。氣急痰
喘。六脈洪實。放痧三十餘鍼。未愈。用圓紅散砂仁
湯微溫飲之。又付必勝湯。大便下黑糞。惟口渴黑
胎未愈。加石膏黃連二劑。乃瘳。

一曹華字長子。十一月間犯傷寒。兼痧。舌卷耳聾。

舌上黑胎芒刺。大渴昏沉發熱身重不能轉側胸
中迷悶瀉痢清水先以圓紅散加鬱金末清茶稍
冷飲之。放指上痧三十餘鍼未愈用阿魏丸付以
防風散瘧湯合稜木湯加桃仁紅花一劑俱微冷
飲之。舌卷耳聾漸愈瀉水即止大渴稍解但舌胎
不退胸中飽悶詢其腹中厥冷痧氣已絕用和脾
宣化飲減前胡大腹皮加桃仁紅花枳實青皮石
膏黃連大黃微溫飲之食結飽悶俱消黑胎芒刺
皆退惟大便不通用大黃三錢芒硝一錢溫飲之

大便通而愈

一張旋庵內室傷食飽悶按之則痛日晡發熱舌
心焦黃芒刺延余脉微無力余曰痧也放腿灣痧
三鍼流紫黑毒血用紫朴湯加柴胡乾葛微冷飲
之後加石膏黃連大黃黃栢溫飲四劑大便下宿
糞而愈

一龔雲濤發熱嘔噦舌有黑胎芒刺起二大泡膝
臥聲重迷悶幾成脉左弦緊右微細放腿上痧
十餘鍼用三黃石膏湯微溫飲之稍愈驟進飲食

痲疹三行重

迷悶復發用消食順氣之劑後加大黃芒硝大便通而安

痲疹兼痧脹

痲疹方惟是升發清涼解利。茲竟有若此不治者。因不知痲疹中有痧也。蓋痲疹乘虛而發。若穢氣暑氣時行不正之氣。亦可乘病而感。苟犯痧者。但先治痧。脹痲疹自發自散。蓋痲疹兼痧脹。痧脹為難。痲疹反隱而難現。不可不辨也。

治驗

一金權可二月間犯時行痲疹。心胸煩悶。延余治之。脈症不合。放痧後用寶花散。併活血順氣消食之劑。俱調黑糖。俟稍冷飲之。復刮痧。訖如前服。一劑乃安。

一潘質黃子犯痲疹。脈微。放腿灣痧。二鍼。血流紫色。及放指上痧。三十餘鍼。付圓紅散。併清涼至寶飲。合紅花湯。俱微冷飲之。即愈。

一余弟賊武子八歲。正月間犯痲疹。胸腹脹悶。煩躁熱渴。咳嗽氣急。面赤身熱。脈不洪大。反見細數。

痧疹五新書

卷

十八

一陸迦安內人發熱咳嗽胸腹疼痛叫喊非常脈
症不合令其僕婦放臍灣痧未愈先以寶花散阿
魏丸清茶稍冷飲之付必勝湯減大黃加枳實連
翹荷子二劑微冷飲之疼痛稍已次日如前劑減
五靈脂加荆芥黃芩微溫飲之疼痛乃止痧疹即
發再劑而痊

一沈端肱女咳嗽發熱脹悶不已六脈弦緊或時
歇指放指頭痧二十餘鍼未愈用寶花散加沉香
末稍冷飲之付防風勝金湯加紅花荆芥治之痧

疹隨發用荆芥湯減川芎加黃芩玄參金銀花微
溫飲一劑而瘳

一陳弘甫傷風發熱咳嗽煩悶脈左沉右洪放乳
上痧一鍼用紫朴湯冷飲痧疹漸現次日為穢氣
所觸復隱隱不發刮兩臂肩背痧用荆芥湯減川
芎加黃芩銀花紅花沙參烏藥微冷飲之痧疹即
發再劑而愈

一高子良弟四歲正月間傷風咳嗽煩悶有以痧
疹治之不發反吐血發暈昏沉延余脈症不合放

痧脹類症

舌下痧二鍼付紫朴湯加黃芩微冷飲之痧疹始
現次日稍飲溫茶半鐘痧疹復隱余曰痧脹餘毒
復發內攻故痧疹隨之而隱又刮痧畢服必勝湯
減大黃五靈脂貝母加黃芩飲之痧疹即透後惟
清涼解毒而痊

痧脹類痧疹

或謂余曰痧脹之發即痧疹也予於痧脹特多放痧
之法爾不知所放之痧即放痧疹之脹氣也安得
痧疹非痧脹之標痧脹非痧疹之本與余曰我見痧

疹從傷風咳嗽而發者有矣未聞有穢氣發痧疹
感熱天暑氣發痧疹者豈非痧疹自有痧疹病痧脹
自有痧脹病乎况痧脹既云即痧疹何以有痧疹因
穢氣暑氣所乘兼痧脹痧疹即隱而不發必俟放刮
後痧疹始發乎乃知痧疹不與痧脹同故刮者放者
名痧脹雖有刮出之痧不可即認為痧疹其痧脹亦
不與痧疹同必因傷風所發始為痧疹實不同也乃
茲有痧脹不因傷風發熱咳嗽所起嘗見刮放用藥
後發出遍身形影如痧疹者雖形似痧疹實非痧疹

痧脹類症

後卷

下

故名之為類麻疹。或曰：詎有非麻疹而形可同於
麻疹者。曰：此亦猶痧毒發為腫毒，發為紫泡之類。爾
何疑乎。

治驗

一聞德音，內入腹中疼痛，右脈微而弦，左脈細而
澹。令其婢放腿灣痧三鍼，血流紫黑色，未愈。用寶
花散救苦丹，清茶稍冷飲之，付以和脾宣化飲，加
茜草、桃仁微冷飲之，發出一身類麻疹者。余用防
風散，秘湯減細辛，加連翹、紅花、金銀花、桃仁治之。

而痊

一施均李孫女發熱咳嗽，腹脹昏沉，微有麻疹形
影，大便瀉黃水，有用升發之藥不效。延余治之，脈
上盛而下虛，乃知發熱咳嗽，雖本傷風實，非因傷
風而有麻疹形影也。放指頭痧二十餘鍼，用圓紅
散調黑糖微冷湯飲之，稍覺清爽，用獨活紅花湯
加山查、蜀子、澤蘭治之，連送一劑，大便下盡黑物
而愈。

一章連瀉三子發熱昏沉腰脇間微有形影與痧

疹相似有用升發之劑惟恐不透次日迎余六越
歌指余曰麻疹之病何遽爾歌指耶雖昏沉氣喘
喉無痰聲脉不合症斯痧脹之類麻疹者與放頭
頂痧兼放左太陽及乳上痧三鍼未愈用荆芥湯
加山稜蓬朮白蒺藜微冷飲之發一身類麻疹者
遂安

一薛思高發熱迷悶氣不得舒胸腹頭面有麻疹
形余診之兩關俱扎此痧脹之類麻疹也放痧十
餘鍼又刮痧訖用沉香鬱金散清茶稍冷飲之而

痧

一張省原子胸腹飽悶昏沉不醒痧筋不現但微
有麻疹形脉左寸關沉細如無右寸亦伏余思麻
疹脉不若是冷其家人用燈心蘸菜油點火燂之
卽醒但飽悶未解用寶花散加沉香蒲黃清茶微
冷飲之付奏凱和解飲減山藥人參甘草加桃仁
紅花治之而痊

麻疹後復痧脹

問痧脹有愈而屢屢復發者矣若麻疹有愈而屢屢
步長玉新註 後卷 一

復發者乎。曰：無有。然則謂麻疹卽痧脹。誤矣。使有疔
麻疹復痧脹。乃卽以治麻疹法治之。誤莫大焉。故曰
麻疹後復痧脹。不可不知。

治驗

一王日斯幼女。正月間麻疹後。瀉痢白色。治之稍
安。驟然腹痛。脈短而微。余曰：此穢氣新觸。作痛非
麻疹之故。放指上痧二十餘鍼。未愈。用救苦丹清
茶稍冷服之。付藿香湯加荀子紅花烏藥木通微
令飲之。卽痊。

一陶元升麻疹後。忽壯熱。面赤。痰喘不已。兩額太
陽抽痛。異常。脈不洪滑。反濡細。痧氣阻塞。脈路也。
痰喘不已。痧氣上壅也。兩額太陽抽痛。痧毒上攻
三陽也。其面赤發熱者。毒盛極而攻表也。均不因
麻疹。而然。啓腿灣。痧筋放六鍼。毒血墨黑。未愈。用
清涼至寶飲。減細辛。加黃芩。乾葛。紅花。牛膝。木通。
微冷飲二劑。漸安。但腹中飽悶。按之則痛。用丁沉
阿魏丸。微溫飲之。又付必勝湯。溫飲四劑。下盡黑
惡毒物。而愈。

一父釣甫子二月間麻疹後遍身疼痛不能轉側
有以麻疹餘毒治之反加沉重延余脉累累如貫
珠時一促疾蓋遍身疼痛不能轉側者痧脹毒攻
血分也脉累累如貫珠疾促者痧脹於中筋脉縮
急而然也反加沉重者誤飲溫熱痧毒內攻勢盛
也放腿灣痧四鍼及臂指痧二十餘鍼咸流紫黑
血未愈用桃仁紅花湯加牛膝山查枳殼磨降香
微溫服四劑而安

麻疹夾痧脹蛔結

麻疹治法易明若夾痧脹不放不刮或犯痧脹之禁
麻疹亦隨痧脹反攻臟腑蛔不能存非吐而出即從
大便而下否則結於大腸臍中作痛治宜先施刮放
後用芒硝大黃攻其夾蛔宿糞令毒從大便而出則
痧脹乃解麻疹輕者自消重者自發矣

治驗

一劉香仲孫女二月間傷風發熱咳嗽麻疹隱現
不發喉啞失音臍腹疼痛昏悶沉沉前醫不治延
余左脉扎右脉濇時有歇指以火照手背指上痧

痧脹五疳書

卷

十五

筋放二十餘鍼用沉香丸清茶稍冷飲之付紫桂湯合荆芥銀花湯俱微冷飲之後連放指頭痧二次如前藥加黃芩石膏芒硝大黃微溫飲之喉稍有聲乃去石膏加黃栢溫飲之下灰蛔四條大便通而愈

一劉姓婢犯痧發熱咳嗽腹痛脈洪大無倫亦夾痧脹者也放腿灣痧五鍼紫黑毒血成流又放指頭痧二十餘鍼用桃仁紅花湯減蘇木合荆芥湯減川芎加黃芩微冷飲之下蛔一條而痊

一過洪甫發熱咳嗽吐瀉痧疹現而復隱口渴唇焦鼻紅瀉血舌有黃胎繞臍硬痛叫喊非常醫治不應其弟德甫延余治之左脈俱伏右脈洪緊放指頭臂上痧三十餘鍼用獨活紅花湯加石膏黃芩芒硝微冷飲二劑瀉下宿糞灰蛔六條痧疹乃發次用荆芥銀花湯加玄參黃芩黃栢微溫飲之三劑而愈

一方原行次子傷風發熱咳嗽煩悶腹中大痛痧疹現而復隱啞失音六脈弦緊放乳上指臂痧

卷之三
傷寒

二千餘鍼未愈。用射干寒湯減甘菊花粉。加
膏桃仁紅花大黃。一劑微冷。飲之。下宿糞。火咽。三
條麻疹始透。夜放臙。灣痧。腹痛餘症俱瘳。

傷寒黃痘兼痧

讀傷寒書有發黃發痘。余以為有痧焉者。蓋發黃發
痘皆即傷寒現症也。或中穢氣。或因暑氣。或感時行
不正之氣。遂兼痧脹。即傷寒兼痧之說也。

治驗

一孔叔元傷寒傳胃。腑口渴壯熱。頭汗發黃。舌胎

芒刺。腹脹迷悶。舌短聲重。氣急發喘。余見脈左寸
關微伏。餘脈弦緊。曰痧毒阻於筋脈。脈氣不宣。故
微伏而弦緊。兼之胃腑熱極。痧毒乘之。一飲熱湯
熱物。痧毒橫行。攻擊臟腑。故見此等惡症。先放頭
頂痧。一鍼次放指頭痧。二十餘鍼。及乳上痧。二鍼
迷悶即鬆。付以烏藥順氣湯。加石膏黃連大黃桃
仁。二劑微冷。服之。頭汗舌胎始退。餘症漸解。復放
指上痧。付枳實大黃湯。減槐花。加紅花芒硝。二劑
溫服。乃瘳。

傷寒

後卷

三七

孫彥衢

一孫彥衢內室壯熱發黃頭汗如雨天湯唇焦
脉弦緊右脉沉微放手臂腿灣上下痧四十餘鍼
流出紫黑毒血未愈付細辛大黃丸沉香鬱金散
微冷湯下用桃仁紅花湯加牛膝石斛二劑微溫
飲之乃痊

一梁鍾素傷寒六日壯熱發癍大渴昏沉余見脉
洪大無倫兩太陽青筋刺痧三鍼放腿灣痧五鍼
出毒血未愈用荆芥紅花湯合清涼至寶飲加石
膏稍冷送下四劑而愈

一湯茂珍次女八月傷寒日晡壯熱口渴發癍
痛如破聲重耳聾吐蛔二條迷悶幾死兩寸脉微
無力兩關弦細兩尺左滑右緊放腿灣痧三鍼略
鬆用清涼至寶飲加黃芩牛膝石膏桃仁澤蘭烏
藥枳殼微冷飲之不應復放痧用熟大黃三錢細
茶一撮煎服而痊

痧類陰症

痧症類傷寒不獨類傷寒傳經熱症觀諸痧變脉候
更有不似陽而似陰者幾令人反疑為真中三陰

痧類陰症

後卷

二十六

寒症痧毒入深也。稍用熱藥熱飲便不可救。瘡

治驗

一章音。卿發熱沉重。口渴。兩額紅赤。唇燥。舌胎。兩
手震動。舉家驚惶。脈沉微無力。時有用乾薑肉桂
治之。有用附子治之。此則認脈為陰。而作傷寒三
陰真寒症治之也。服之。危篤。延余。四子端英診之。
知其脈症不合。看腿灣。痧筋。放四鍼。流紫黑毒血。
付石膏黃連黃芩兼活血順氣之藥。稍冷飲之。一
劑而鬆。再劑而安。

