





婦人諸病 卷一 五

婦人諸病

處女病篇第一

大較ヲ論ス

此病處女大抵經水初来ル頃旋又ヘキ頃ニシテ面色黧ク  
淡ク或ハ黄セラカス

此病因ヲ論ス

此病亦他ノ病因ノ如ク相厚ノ血ヨリ充テ不珠ニ至リ或ハ幾里兒  
ヨリ分利スル等相害ナレ由ル此則血中ノ揮発鹽不足ナルニ  
因テ諸般幾里兒汗相凝ヲ為シ其幾里兒及尿管ニ於テ

佐藤安司藏書



通流スル一途は息慢レ此ニ由テ血ノ稠者凝滯ヲ生ス  
 遂ニ甚シキニ至テハ体水ノ如キニ至ルナリ故ニ其ニ漿液卵巢  
 ニ乘リ此ニ由テ平常ノ如ク精力揮發強ニ血ヲ稀解シテ子  
 宮ノ幾里兜ヨリ分利スル一能ハス故ニ月經閉止スルナリ○或  
 ハ子宮自己ニ患害アリテ閉塞ニシ或ハ瘀血留滯シ而メ此力  
 腐敗スル寸ハ毛沃ヲ失ヒ及身体解惰悪心及異常ノ嗜  
 食ヲ發ス此ニ由テ血力无ク淡薄粘稠ヲ為シテ水液カ稠結シ而  
 メ顔面及他諸部膨腫ス此則稀流ノ稠液程好通利セサル  
 カ故ナリ又此ニ就テ不断倦惰困重ヲ發スルモノハ血液ノ凝急ナル  
 運行ニ由テ精氣力程好ク揮發透充セサル故ナリ又此ニ就

紅一

テ不断倦惰困重ヲ發スルモノハ血液ノ凝急ナル運行ニ由テ精氣  
 カ程好ク揮發透充セサル故ナリ

看法ヲ論ス

此病ハ久ク遷ルモノナリ然レ危病ナラズ毎時嫁スルニ由テ自忘  
 スナリ又此病ニ患ルモノハ每日子ヲ為シ或ハ女子ヲ生テ而弱ナリ

治法ヲ論ス

此病ノ因塞ヲ治スル一肝臟閉塞全盤ニ説カレト知レシ又月經  
 閉ヲ兼ルモノハ經閉全盤ノ藥劑ヲ用ユヘシ  
 惡化ヲ驅逐スルニ大黃旋那葉アカリコス等ヲ用ユヘシ○利  
 絡若按スル要トセス然レモ格別執性及多血満余ノモノ為



ヘキナリ ○此病宜毎日大陽煎ノ琥珀自夫藍側石  
精等ヲ用エシ或ハ後法ヲ用エ

側石精

麻角精

各等分合し毎日酒ニ滴シ

ヲ用エシ又鴨菊ノ煎湯或ハ則鉄酒良効アリ ○竜胆  
ニ泊夫藍燒酎ヲ加ヘテ用テ効アリ 此揮發精ナレバナリ又甚  
浴湯ト為シ施スル艾竹石薄荷側石甚甚塩胡椒葡萄子  
糖倍子等ヲ以テ制スヘシ

又後方ノ丸ヲ用エシ

アムアムセミアシ、タルタリ、ロツトリ、ララナ、各三錢、泊夫藍

三錢、又、ササ會、剛鉄粉、各三錢、波茶、一錢、内葯、麩、油

三二

隨宜 右合為丸

又艾竹ノ砂糖漬、ホツクホウト、葉、甚良効アリ

又チシクチエラ、カレイ、ゴス、甚効アリ

又スヒリチス、タルタリ、甚良

又、ヒレヒス、カクチエス、クニセタニ、此病及癩、黃病、異嗜、病ニ大効アリ

リ其方

鋼鉄極細末、加硫、薑梨者、八錢、竜涎香、一錢、芳、珊瑚

浸真珠、各三錢、製琥珀、桂、各一錢、三分、三厘、砂糖

隨宜、石考、抹、服、量、銀、三、字、分、花、用、工

養生法ヲ端



食物乾キテ消化シ易キモノ 雞肉 雉肉 羊肉 鮫魚 好キ酒  
ヲ一盃ヲ服シ又身体ヲ運動スルヲ在良眠リテ寢カシ又茶  
湯甚良ナリ又毎日洵夫藍ヲ用テ甚良ナリ

婦人異嗜篇第二

此病前ノ卷之一第四十六善識異嗜篇ト同シ

經閉篇第三

病因ヲ論

子宮或子宮脈閉塞或ハ血カ粘稠ニシテ子宮へ通利スルヲ得ズ此ニ  
因テ其血カ瘀滞シ腸胃ノ壅者ニヨツテ終ニ積敗シテ止ムヲ得ズ惡  
血ヲ生ズルニ至ル○又舊敗ノ精水小丸子ニテリ或ハ鬱精ヲ放泄  
スルヲ得ズハ血カ精カヲ得ルヲナリ鬱結ニ勞ナリ○又血中ニ揮毫  
ノ精氣ナク及多ク酸敗液アルハ揮散解暢スルヲ得ズ及運  
行流利スルヲ得ズ此由テ稠濃粘着ニナリテ子宮ニ分利通泄  
スルヲ得ズ此由テ子宮ノ發里兒大ニ閉塞シ經水滲出スルヲ得  
ズ也又錢里兒汁カ子宮ノ部分ヲ浸潤シ或ハ子宮ニ燥熱アリ或ハ硬



頑硬腫アリ或ハ合閉塞着シ此痛因トナル  
凡テ如此諸因ニ由テ血カ常道ニ通除シ去ルテ得サレハ其血カ他ノ  
諸道ニ通泄スルナリ

看候ヲ論ス

經閉ニ由テ人皆雌身ナルカ或ハ他ノ病患ニ依テ經閉ス  
ルヤヲ疑フナリ此ニ由テ証察先ツ弁別ノ大概ヲ知ルシ  
第一ニ雌婦ハ多クハ顔色平全ナリ經閉ハ顔面を沃  
ヲ失ヒ黯淡汚色ヲ見ハス  
第二ニ雌身ノ定リタル諸症ヲ最初ニ察ストイハ尼漸々  
ニ減シ退クナリ但シ經閉ハ最初ニ格別ニ病証ナシトモ尼衝々

ニ時日ヲ經ルホト諸症イヨクニ增長シテ止マサルナリ

第三ニ其經水ノ止リタル時ヨリ四五ヶ月ニ至レハ胎子ノ運  
動ヲ覺フ又經閉ハ二箇ノ時ヲ為トイハ尼水ノ如ク及同

カラス

第四ニ雌ハ多クハ精神ニ妨ケナリ喜色アリ經閉ハ神思沈  
重愁鬱ス

看法

此病ヨリ動モスレハ熱痛閉塞子宮脛逆惡液腫痛水腫冒頭痛  
痛心痛等ヲ察ス不ウサレモハ甚タ危シトス



蘇根、白芷根、五種空桐根、芦根、花蒿根、香附子、ハスナ、葱  
 根、萊菔根、カウニス皮、ネリスキ天皮、月桂皮、青蒿、茵陳、  
 竜茅、菜、蘭、芥、艾、アルチブリス、珊瑚樹菜、爵仕、山鳥  
 ケルル、立浪、鴨、蒼、燻、煙、羅、薺、時、蘭、  
 地錦、敗、石、薄、荷、万、年、縷、芸、香、側、柏、紫、蘇、薄  
 公英、武者、輪、塔、茵、陳、花、鴨、菊、花、春、菊、花、洵、夫、藍、葉  
 蒿、花、ホツ、花、苦、薺、花、蒼、苳、子、杜、松、子、月、桂、子、夏  
 枯、白、芷、子、苗、香、子、蘭、芥、子、菜、菔、子、苦、香、子、芥、子  
 阿魏、ガルム、アムミア、没、藥、竜、腦、蜈、蚣、サ、毛、青、カ

丑ノ五

スト、糊、粘、壳、犀、角、鹿、角、硝、砂、花、コ、ク、ニ、ル、千、ス、珠、珀  
 積、尿、精、白、砂、精、烏、菴、尾、精、的、列、面、底、那、マ、キ、ス、ト、リ、エ、ム  
 カ、レ、イ、ア、ス、カ、ス、ト、レ、キ、  
 カ、レ、イ、ア、ス、カ、ス、ト、レ、キ、

例

毛、病、因、承、此、驅、除、而、メ、子、宮、ヲ、開、通、ス、レ

法

刺、結、宜、シ、カ、ス、宜、ク、服、勝、ク、清、掃、ス、レ、即、後、方、ノ、類、ヲ、用、ス、レ  
 芦、薈、一、キ、阿、魏、コ、ム、ア、ム、ミ、ア、レ、没、藥、マ、キ、ス、ト、リ、云  
 カ、レ、イ、ア、ス、カ、ス、ト、レ、キ、一、方、六、重、寧、中、膏、一、方、方、側、柏、油



右台考 托服度 三分三厘

又方

苦薏 側柏 各二握 胡蘿蔔子 独活 各八錢

右水煎取二十四分 濃過上火蒸氣ヲ升シ其間ニ後蒸ヲ加フ後

草ニテリニツリ丸各二錢 蒼朮膏 牽牛膏 各一錢 カストレ

云 二分七厘 烏鳧尾猪十二箇

右台考 托服度 三分三厘

又其間ニ月経 驅世ノ劑ヲ用ユシ 昔ケケンチヲ サヒナヲ 檢用ス

其方

側柏 乾者三錢 独活子 胡蘿蔔子 各四錢 蓬砂

五フ六

泊夫 藍 各二錢 一キストリ云 カレサブス 一錢 雙劑 二

百四十錢

右毎日空心四錢ヲ服

又方

クルタリ云 レツトリヲリ 四錢 一キストリ云 カレサヒス 二錢

側柏油 一錢 砲砂花 一錢 白砂糖 十六錢

右台考 藥子服度 二錢

又方 スロリナス 一キステリクス ノフルテルノ方

乳香 沒藥 ヲリバニ 琥珀 各四十八錢 側柏

三十三錢 燒酒 四百錢



右細鴉キ莖露罐ニ入シ數日暖沙上ニ於テ泡  
 出シ而メヨク攪合シテ露水ヲ滴シ而メ其罐内ニ残リ  
 久粘固ノモノアリ此上ニ又再ヒ前ニ滴シタル露水ヲ注  
 キ入レテ二度引ニ露水ヲ滴ス  
 右ノ劑甚透透香烈シテ此ニ由テ鍾団子宮衛逆臨產  
 等ニ滴服シテ奇効アリ

又方チシチエラスヒテリカノ方

カストレウム 未ニキ 琥珀鹽 硃砂 艾中塩 各五分

燒酒 六十四キ

右程久シク泡出シ流帛ニテ濾シ貯フ此病ニ大奇効アリ

四七

向所勝ニ合スル于  
 又別方チチチチチ

燒酒 四十八キ 側柏半握 剛鉄四キ 斑猫 一方七厘  
 右合毎日一匕ヲ服ス

又後方奇効アリ

紫竹仁 苗香子 標上羊兒藤 各三キ 干ククム又ス

一キ 泊天藍 三分三厘

右適宜ニ酒ヲ注キ十二時泡出シ此ヲ少シク煮沸シ三十二キ

宛服

尚又子宮ニ云アムモアレ 所魏 ヤカハヌム 等ヲ貼シ或ハ側  
 柏煎ヲ水鏡ニテ子宮中ニ灌射スニシ  
 或ハ如此藥劑ヲ時々蔬菜ト為シ食スニシ



崩漏篇第四

病因

此病因六稠厚ニシテ酷厉ナル血アリニ因ル然レモ子宮幾里宛  
 ノ閉塞無クテ大ニ血力進突シ来リ其精カヲ以テ体外へ  
 破綻シ出此死毛鬼血ノ如シ何トナレハ稠厚ノ血力大洒スルニ由  
 テ皇ハ押出シ出ルカ如シ其故ハ此稠血力常度ノ如ク緻細ノ  
 脉管ニ通暢スルヲ能ハス此ニ由テ子宮ノ細絡及氣孔弛  
 延ニ或ハ破綻シ自ラ押出シテ外泄スルナリ○又此病毀創  
 突撞打撲失落等ニ由テ破綻スルナリ

看法



大ナル崩無六危篤ナリ何トナレハ血減耗シ精力脱隳シ此  
ヨリ水腫惡液腫病失気昏厥等ヲ瘥ス

治例

其押出衝突血ヲ盛緩ニシ又一ツニハ血稠厚ナルノ起原ヲ  
除治シ及血ヲ稀薄ニスヘシ  
某劑ハ小兒ノ衄血篇大人衄血篇及吐血篇ニ同シ

治法

山崩泄過多ナルモハ半足ヲ緊縛スヘシ然レハ時々緩メ巻置  
スヘシ而シテ後方ヲ此フヘシ

大陽煎 阿仙茶 二十四匙 乳香 蜚蛄石 一匙 竜腦

五ノ九

純ニ

此方阿片 三厘 三七 或五厘

右合シ匕服スヘシ

又方

ウイールラーリ 乳香 雞卵壳 各等分

右為丸 毎日二度一匙匕服

又方

白聖 乳香 各一匙 蜚蛄石 標樹苔 各一分

七厘 ラウタニヲシヒアチ五厘 珞陀回 四十八匙

右合匕服

又方



乳香 赤石脂 製剛鉄 各三分三厘 鉛白霜  
 一方 竜腦 白堊 刺蝟石 各共方 白スプリエラ  
 附録一分七厘 勿轉茶の列面底那 隨宜  
 右合為丸腹量三分三厘每且空心服ス

又方

鷄卵壳 白三云ロヌム 見室函各二枚  
 右合為紙茶

又方

没食子 乳香 玫瑰花 白堊 標葉 赤石脂  
 各三分三厘 鉛白霜 一方三厘 コロクス マルチヌ 一枚  
 五ノ十

右合為未服量一枚

又炙リタル肉ヲ鍋ニテ乾カシ搗テ服セシム甚良ナリ  
 而後身体ヲ清除スルニ大黃及訶子ヲ用ヒ又子宮ニ塗エルニ  
 エシテトマニチツス及鉛白霜或ハ赤酒ヲ浸シタル布ニ没石  
 子ヲ未ラ加テ貼スヘシ然レバ外用茶ハ格別秘用セス  
 何トナレハ通達シ難キカ故ナリ○又米粉ニ桂末及極細末  
 ノ雞卵壳ヲ又ハ別紙ニテ用テ効アリ○又乾シタル暇葛  
 ヲ着テ陰乾ニ押ス言効アリ○又バスカクウス後方ヲ秘用ス  
 方

燈籠卵壳 二個 ウイルラトリク 乳香 各四枚



真珠 赤珊瑚 琥珀 各二枚 血石 三枚 スミラ

グク 各一方七重 大麦粉 二撮 鶏子白 四個

右合此ニ少ク剛鉄水ヲ入レニツノ餅ニ作り鍋ニテ炙リ

乾カシ為未服度方ヨリ一匙ニ至ル尚又宜ク羊脚肉

汁ニテ服スヘシ

又苧麻汁ヲ二十四匙或三十二匙服シテ甚良効アリ或又剛鉄

ヲ焙シタル乳汁ヲ服シテ良又玲瓏硝ニ醋ヲ浸シ及燒名綿

布ヲ子宮ニ挿刺シテ良

白帶下篇第廿五

大較

此病六時を或不動白汁ヲ子宮ヨリ流泄スルナリ此ニ區別

膿様汚汁ヲ出ス症アリ此膿瘍アリトス則其膿稠者子

ニシテ白色ヲ熱シタルモノナリ一ツ水ノ如ク及血ヲ含ルモノアリ此或

細絡織條ニ觸シテ大疼痛ヲ發シ婦人交授ヲ為ス可能ハス又交

授ヲ為スニ疼ナシ其泄出タル汁膏ク稠厚白沢久ク時々休ス又惡

臭トキヲ善症トス又癰人ヨリ傳染シ小便欲熱シ陰處膿瘡ヲ

生スル等ノ手ハ惡性トス

病因



此子宮寒陰莖等ノ幾里兒ヨリ多クノ液汁ヲ滲出スルナ  
リ何トナレバ此液過度ナラサレハ平全ノ潤液入用ノモノニシテ疾痛  
ニ非ス此カ右ノ如ク過度ナルヲ以テ疾痛ト名クコレハ凡ソ甚シキ積  
血アリテ其幾里兒ノ内ニ大ニ溜滯閉塞ス何トナレハ甚ク発汗ヲ  
泄スルイナク及皮表ノ幾里兒ニ多クノ液ヲ逼出シテ留止スル時  
ハ此レカ爾ハ水脈ニ流行シ血中ヨリ子宮ノ幾里兒ニ留留ス此則白  
帶下ノ液汁トナルノ正理ナリ

看法

此ハ死病ナラズ經久ナルト血ニ難キナリ○又此病ヨリニノ無乃子ヲ  
為レ或ハ水腫惡液腫痛勞瘵潰瘍等ヲ発スルモノナリ

エノナニ

治例

血中ノ粘液ヲ清除シ子宮ノ幾里兒ノ閉塞ヲ開通ス

治法

宜ク身体ヲ清除スルニ大黃鬼茛菪アカリヲ入等ヲ用テスヘシ  
或ハ後方ヲ用エ

大黃 六分六重 鬼未利根 三分三重 荳蔻香油

二滴

右為平

又方



琥珀鹽 湯血 各三分三厘 鬼米利根

一分七厘

右合為時

又方 酸毒ヲ制殺スル劑甚 肝要トス 則千山明漏篇ニ舉ルモ

ナリ 或ハ後方ヲ用ユ

乳香 末 ウイルラーク 未 蜉 蝨 石 各等分

右合為散劑 毎日二度一匙宛服ス

又和カニ收瀝スルモノヲ子宮中ニ灌入シ 或ハウイルラーク 檀

木 肉豆蔻等ヲ燒テ子宮ヲ煙薰ス

○又大黃ニ的カ 面底那ヲ加テ紙茶ト為シ用テ甚良効アリ

又全剛利ノ煎湯甚効アリ



花風卷柱篇第六

大較

此任種類ナリ則精神錯乱ニテ安ニ交接ヲ好ミテ耻ル  
更ナリ恐懼ナリナリ又忘リニ顧慮セズ流事ヲ説言ス

証候

大較章ニ陳ルガ如シ又初奈ハ大抵精神沈重憂愁沈  
黙静僻ヲ為シ眼目ヲ旋回シ頬紅ニシテ光沢ヲ失シ而シテ  
増長スレハ淫思ヲ言行ニ顯ス而後呼吸脈妻スルナリ此病  
最高ニテハ言語啗歎呼吟時々毒ノニ笑ヲ奈シ許多ク馬  
鹿ナルト作ヲ謔奈シ此ヨリ正シキ奇知ヲ失ヒ命後ハ時々体



止を作アルナリノ尚最高ノ極ニ至ル婦人カシモ憚意ナリ  
公ニ注夏ヲ諸男子ニ説クニ至ル

病因

此病ハ精水ノ鹹味カ刺衝スルノ過大ナルナリ吾按ルニ此液カ  
陰莖ノ幾里見ヨリ出テ阴果ヲ衝動勃脹シ此液ハ全体精  
体清ニ而シ煽動ノ慾念ヲ精氣ニ輸轉スルニ至ル○此病處  
女及寡婦ノ胃子ヲ思フモノニ多シ又或ハ嫁シタル婦人ニテモ  
其夫弱シテ婦ノ欲ニ満足スラズ○吾此病ノ婦人ヲ解觀  
スルニ卵巢甚腫起シ及嫩腫ヲ為ス此ハ液汁ノ稠厚或ハ  
閉塞シ此由テ其液汁カ卵巢ヨリ裡好ク通流スルナリ

此ニ留止テ漸々ニ酷厉ニテリ及此ニ精氣カ甚々多ク運動  
スルヲ以テ凡ノ隱處ニ於テ大熱及衝動ヲ察ス故ニ慾念忘  
動シテ遠ニ神知ヲ乱ルニ至ル

或ハ少年ノ胃子多血有奈大酒ニ或ハ大食ニテ辛熱ニ及  
硫黃様ノ食物ヲ食ヒ或ハ少婦ニ觸ル或ハ淫色ノ唱哥書画  
ヲ見ル等ヨリ淫心ヲ生スルナリ

着法

此病初発ハ治シ易シ然レモ經久ナルモノハ枉病ニ變ス

治例

其酷厉毒及閉塞ヲ用通スニテ而シ好キ養生飲食ヲ守



治法

茶劑ハ多ク狂痴篇ニ見ユ宜ク考檢スヘシ  
 先ツ宜ク刺絡ヲ施シ而テ時々再々此ヲ施スヘシ此ニ由テ血及滯濁  
 津液ヲ生シ清涼ニテリ治ムルナリ然レ此ニテ痴原ヲ根絶ス  
 ト云ニ非ス故ニ吾刺絡ノミヲ要トシテ強ク為サレナリ故ニ凡テ  
 此病最高ニ登リ狂妄甚キモハ其酷厲液ヲ制殺シ困塞ヲ  
 通スルノ茶劑ヲ用ユ○又月経困塞スルモノハ宜ク経閉篇  
 ノ治法ヲ以テ後治スヘシ○此病ニハ使通利ノ劑甚効アリ  
 ○茶湯尤良○又時々腹ヲ滌除シテ鹹味液ヲ除クヘシ

○又外ヨリ塗ル茶ヲ良効アルモノハ使テ其岩油燭虫粟油樞実  
 油ニクモトアストリンクアルバカムフラボヒユイカルキス カルカムフ  
 ラ等ヲ腫ニ塗搽シ又背部ニ鉛匾ヲ帯ヒ及此ヲ腹ニ帯又シ  
 ○又良効アル小便通利ノ劑ヲ撰用スヘシ尤良トス

養生法

居室ノ気ハ凡テ清涼ニスヘシ飲食ハ淡稀清涼ヲ第一ト  
 ス必酒ヲ飲ム勿レ○又食ヲ寡シ酒ヲ飲テハ淫情ヲ抑  
 裁スルノ法ナリ○又鹹味糖キモノヲ禁ルト勿レ鹽鹹ハ淫情  
 ヲ動ス○又凡テ淫氣ヲ誘スルノ事件ヲ固ク見聞シム  
 ルト勿レ



子宮衝逆篇第七

大較

此病助回ニ蔓延スル一對ノ神經ノ牽奪スルナリ故ニ大抵  
此病他ノ神經ニ及ラズ稀ナリ又此ニ就テ腹中固形ノ物アリ  
リテ衝逆ニ雷鳴シ腹ノ腹部痞脹ニ吐瀉氣呼吸存  
シラズ咽喉官道ニ頸目眩暈或ハ呼吸シ書語ニ難ク  
或ハ沈黙シ言フヲ能ハス身体ヲ舉動スルヲ能ハス或ハ顔色  
青黒或ハ脈常ノ如ク或ハ沈微或ハ全ク絶止スルモアリ

病因

此病因ニ積氣或ハ月經血ノ酷厉液或ハ子宮中ノ水或積



水ノ滯敗或ハ脾肝及其他ノ部分ノ病患障礙何トナシハ此在又胃  
 子ニアル等ヨリシテ神經ノ支未ヲ衝動シ以テ緩急凸凹脊  
 シカラサルノ牽引ヲ為ス此ニ由テ婦人又衰弱シ些方ノ起原  
 アリテ毛崩起テ精氣力急テ蔓延スル神經及脚間ノ神經  
 ヲ牽急牽引ス此ニ由テ腸胃腸膜及此ニ懸連スル諸腸ヲ加ヘ  
 テ束縮シ固形ノ如クナリテ高ク牽引ス此ニ次テ肺臟奔張シ  
 神經叢カ頸ニ牽引シテ呼吸不利咽喉窒迫苦悶ヲ面色蒼  
 スルニ至ル○又痲痺ノ症アリトイハレヨリ病性ヲ察シ多少區別ア  
 ルヲ知ルシ

者法

此病、久ク復レ難キモノナリ殊ニ年ヲ歴ルモノムワカキナリ甚タ危  
 重ノ諸症ヲ發スルモノ死ス○又少年婦人産後ニ起ルモノ自ラ休ム  
 モナリ但レ産婦ニ發スルモ亦危キトナリシハアラス○發作ノ時ニ噎ヲ  
 發スルハ良候トス又芳香ナルモノ麝香香狸桂等或ハ惡臭ナル蠟  
 燭ヲ燻ルニ臭等ノ類ヨリヨク起ルトアリ如此類ハ此ニ由テ精氣力  
 衝動スルカ故ナリ

治例

治的ニ般アリ第一ニ發作ノ時ニ先ツ其ヲ發作ヲ消除ス  
 第二ニ發作後ノ治法ニ於テ亦三等アリ一ニ血ノ汚液及汚血ヲ清除  
 スレニ精氣ヲ種ハニ又レ三ニ子宮或ハ其他ノ諸部ノ先常テ







葛<sup>ヤ</sup>或ハ故<sup>ハ</sup>椒<sup>ヲ</sup>自<sup>ニ</sup>毘<sup>ニ</sup>吹<sup>テ</sup>噴<sup>セ</sup>シ<sup>ク</sup>或ハ皮<sup>ヲ</sup>剥<sup>テ</sup>ス<sup>ル</sup>セ<sup>テ</sup>顔<sup>ニ</sup>當<sup>テ</sup>  
流<sup>ラ</sup>流<sup>シ</sup>○又直<sup>ニ</sup>腸<sup>ノ</sup>水<sup>ヲ</sup>鏡<sup>ト</sup>ト<sup>ス</sup>伊<sup>ス</sup>巴<sup>ニ</sup>亞<sup>ニ</sup>石<sup>ノ</sup>酸<sup>ト</sup>麥<sup>酒</sup>ヲ以<sup>テ</sup>作<sup>リ</sup>施<sup>ス</sup>  
シ或ハ鹽<sup>ノ</sup>酒<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>作<sup>リ</sup>施<sup>ス</sup>○又子<sup>ノ</sup>宮<sup>ニ</sup>刺<sup>ス</sup>ス<sup>ル</sup>鹿<sup>ノ</sup>射<sup>香</sup>ヲ以<sup>テ</sup>ス<sup>ル</sup>  
○又膽<sup>ヲ</sup>塗<sup>リ</sup>シ<sup>ク</sup>香<sup>ヲ</sup>麝<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>シ<sup>ル</sup>或ハ後<sup>方</sup>ヲ貼<sup>ス</sup>○  
エム<sup>フ</sup>ラ<sup>ス</sup>ト<sup>テ</sup>ア<sup>ハ</sup>ル<sup>ニ</sup> 四<sup>支</sup> 竜<sup>腦</sup> 二<sup>支</sup>

右合為膏<sup>膏</sup>茶

又<sup>テ</sup>葉<sup>ヲ</sup>子<sup>ノ</sup>宮<sup>及</sup>小<sup>腹</sup>ニ施<sup>ス</sup>ヘ<sup>レ</sup>患<sup>ナ</sup>ク

艾<sup>葉</sup> 苦<sup>意</sup>葉 石<sup>ノ</sup>薄<sup>荷</sup>葉 <sup>ホ</sup>此<sup>ノ</sup>華<sup>葉</sup> 甘<sup>香</sup> 各

一<sup>握</sup> 独<sup>活</sup>子 胡<sup>菴</sup>荀<sup>子</sup> 各<sup>八</sup>支

右<sup>レ</sup>此<sup>ノ</sup>煎<sup>取</sup>自<sup>ニ</sup>十<sup>支</sup>漉<sup>過</sup>加<sup>之</sup>甘<sup>香</sup>油<sup>十</sup>六<sup>支</sup>底<sup>ニ</sup>列<sup>面</sup>帝<sup>那</sup>

早<sup>テ</sup>テ

二<sup>支</sup> 右<sup>合</sup>為<sup>蒸</sup>茶

又<sup>テ</sup>葉<sup>ヲ</sup>製<sup>シ</sup>テ<sup>テ</sup>施<sup>ス</sup>ヘ<sup>レ</sup>患<sup>ナ</sup>ク

芸<sup>香</sup>油 十<sup>二</sup>支 帝<sup>力</sup>面<sup>愈</sup>那<sup>精</sup> 二<sup>支</sup> 竜<sup>腦</sup> 一<sup>支</sup>

右<sup>合</sup>為<sup>塗</sup>茶<sup>此</sup>ヲ<sup>細</sup>長<sup>ク</sup>切<sup>花</sup>碎<sup>境</sup>確<sup>ニ</sup>浸<sup>シ</sup>テ<sup>テ</sup>子<sup>ノ</sup>宮<sup>ニ</sup>サ<sup>シ</sup>込

或ハ切<sup>レ</sup>塗<sup>リ</sup>テ<sup>テ</sup>膽<sup>ニ</sup>貼<sup>ス</sup>○

又<sup>レ</sup>口<sup>ノ</sup>痛<sup>ニ</sup>就<sup>ニ</sup>多<sup>ク</sup>ノ<sup>婦</sup>人<sup>ノ</sup>此<sup>ノ</sup>病<sup>ヲ</sup>治<sup>ス</sup>ル<sup>ニ</sup>單<sup>ニ</sup>確<sup>砂</sup>精<sup>ノ</sup>

香<sup>氣</sup>ニ<sup>由</sup>テ<sup>頰</sup>ニ<sup>治</sup>ス<sup>ル</sup>皆<sup>稱</sup>譽<sup>言</sup>ス<sup>ト</sup>テ<sup>リ</sup>

又<sup>後</sup>方<sup>ヲ</sup>口<sup>中</sup>ニ<sup>含</sup>ム<sup>ヘ</sup>シ

石<sup>ノ</sup>薄<sup>荷</sup>精 十<sup>二</sup>支 瑞<sup>珀</sup>油 四<sup>滴</sup> カ<sup>ス</sup>ト<sup>レ</sup>云<sup>一</sup>方<sup>七</sup>支

ラ<sup>カ</sup>タ<sup>ニ</sup>ラ<sup>フ</sup>ビ<sup>ア</sup>タ<sup>一</sup>支<sup>七</sup>支



右合

又方

アトヘイステリカ 十二匙  
クシクキエラ カストレウム

三分三厘 鹿角精 六滴

右合

又竜胆ニ火ヲツケ水中ニ投シ燃ヘ尽テ消スルニ至ルモノ此病ノ

奇薬トス

又後方ヲ腹スヘシ

麝香 罂血 各三分一厘 橙花水 二十四匙或三升

ニ匙 右合

又此病ニ秘用スルハバスキチン子或ハ樓斗菜子ヲ適宜ノ飲汁ニテ  
暖ムシ又心部ニ掛ルニ所魏 カストレウム 琥珀油ヲ袋ニ入タルヲ  
以テスヘシ

凡ソ器作終ルニ至ラハ宜ク下劑ヲ數ニ施スヘシ其方

ピルラフトモヨシス 見室函三分三厘 鬼茉莉脂 八厘ニモ

タルタリヒツトリヲラ カストレウム 各一分 ゴムアムモニアシ

隨宜

右考八丸

又方

鬼茉莉脂 三分三厘 甘草丹 五方 カストレウム



一方七重

右考丸服度三丸

又方

アガリクス トロシ 一匁 五分

一匁

胡椒腹子 白芷子 各三分三厘 没薬 カストル チヤグ

リキ云 随宜

右合考丸服量五分

又アレンテルス 祿譽ス 後方ヲ時々用之ニ此ニ由テ 腦及精氣ヲ毫  
分種ハニスルナリ

麝香 九厘 安息香 五分 白砂液 五分

五ノ七二

桂水 随宜

右為末

又剛鉄削良知アリ 宜後方ヲ用之ニ

石薄荷水 アクワアントトエレフト 各十二匁 キンクチエラ

カストル 五分 マキストルム カキアス 五分 大陽並側柏

八匁

右合ニ服

又方

バクナケン仁 接骨木子 各八匁 カストル云

五分 剛鉄 二匁 燒酒 九十六匁



石散日泡出レ毎日八錢ヲ服ス

又方

苦薏葉 藿香葉 石薄荷葉 各一握

胡蘿蔔子 各十二錢 カストリエム

帝野加泊夫藍 各二錢 白酒 四百錢

右合露水ヲ滴入毎日一匕ヲ服

又子宮ニ患害アルモノハ宜ク先此ヲ復治スヘシ或ハ此病産婦ニ於テ  
産泄強ク或ハ産泄惡露不下或ハ胞衣不脱等ヨリ此病ヲ  
悉スルモノナリ○若月經血遺セサルモノ宜ク此ヲ通泄スヘシ○昔  
毎時硝砂積ヲ單ニ鼻中ニ容シテ大効ヲ得ルナリ○合良物

五ノ北ニ

八消化ニ難ク胃ニ停滞スルモノヲ忌



子宮嫩腫及潰瘍篇第八

大較

子宮ニ嫩腫ヲ生スルモノハ子宮閉塞ニ稠多ノ液アリテ嫩腫レテ子宮腫大ニナリ赤痛ヲ起ス他諸症尤多シ

區別

子宮益ク痛ヲ受ルモノアリ又子宮ノ一部分ニアルモノアリ又裏面ノ膜或ハ外面ノ膜或ハ絨毛膜或ハ陰莖ニテ各所在異ナリ〇凡ソ内京ハ留滞ノ血液アルモノ外國ハ打撲障及等

證候

指テ子宮ニ容ルニ外表時ニ寒感シ而メ時ニ熱ス而ノ斷ハズ振



寒戰慄ヲ登シ舌燥キ且黒セ此ニ執テ煩渴不寐澹諾煩燥  
乳房時々膨脹シ物身疼痛シ鼠鼯ヲリ腹助隔膜肋膜  
等疼痛シ呼吸不利促進シ或ハ腰痛痛ニ似タリ○此ニ執テ吐  
吐惡心呃逆シ便不通或大便秘結脈微小初ハ腎氣眩暈四肢  
寒冷額ニ汗ヲ奪ス又子宮嫩腫カ膿瘍トナレハ諸症強大ナルノ  
減消スナリ

病因

此ハ水脈乳糜液鹹液カ留滯シ或ハ脈外ニ溢在シテ子宮ノ膜  
ヲ刺衝牽キテシテ又滯留膨脹シ血ノ運行ヲ阻遏シ此ニ由テ  
鮮涕蒸熱シ及大痛ヲ生ス○又其疼痛ノ来ルハハ脈外溢

留ノ液或ハ攻衝スルノ力此処ニ於テ快利通行スル能ハス此ニ由  
テ鮮涕ニ嫩赤シ疼痛及嫩塊ヲ生ス  
又此汚液カ新ハス血中ニ浸滲シ物血海ニ移蔓スルトキハ乳糜  
カ腐敗シ新ハス鮮涕ニテ溢熱ヲ奪ス○又子宮ノ膜ヲ連及  
シ此ニ由テ諸部突力ガキノ運動ヲ覺フ外因ハ打撲失墮或  
ハ月經ノ時ニ寒氣ヲ受テ或ハ勞動過度難産産時ニ於テ  
産科術ノトリアツカヒ悪キ等ナリ

着法

此病甚危篤トス動モスレハ死スルモノ多シトス殊ニ孕婦ハ尤モ危  
シトス此病動モスレハ腹痛耗病或ハ頑硬腫ニ変レ易シトス○



又膿瘍トナリハ消散スルヲ最良トス何トナレハ膿瘍トナレ  
 モハル後汚穢ノ瘡經久ノ潰瘍トナリ常療也或ハ此種病  
 トナレナリ又膿ヲ成スモノ其膿子宮中ニ滴泄スルヲ良トス子宮  
 外ハ腹ニ滴流スルヲ惡症トス吾々六百七十四年ニ於テ此病ノ  
 膿ノ子宮外ハ腹ニ流ルモノヲ見ルアリ一貴婦ナリ此田  
 テ腸悉ク膿潰レ而後死スルニ至レ

活例

補凝及閉塞ノ血ヲ稀散シ惡液ノ固着留結スルヲ驅散シ  
 或ハ膿ニ變化シ而メ泄除スヘシ

活法

五ノ七六

和力在下劑ヲ与フシ所沒勒據甘露蜜李梨酒石鹽レテヒ  
 云見室函等良ナリ又大便秘結セ直腸水鏡法ヲ施スシ  
 又後方ヲ子宮中へ灌入スシ

煎水 八分 竜腦 五分 硝砂精 六滴  
 右合灌入ス

右劑ヲ能シテ最初ハ火熱ヲ去テイ比其後ハ清涼ニナルナリ  
 或ハ又膿及陰部ニ綿布ヲ當テ而メ右劑ヲ浸莖スヘシ或ハ鴨  
 菊スニテ草雲陵菜紫蘇石薄荷艾中苗香等ヲ石  
 油ニ施スモ良ナリ○若シカ膿ヲ為スモノハ宜ク軟化スルノ藥ヲ  
 用ニシ則錦葵白芍藥珊瑚樹菜火焰菜薑三七米鴨菊



草薺<sup>ミルホリユム</sup> 陵菜<sup>ミルホリユム</sup> 亞麻仁 胡芦巴 無梁花<sup>ミルホリユム</sup> 等ナリ。○或ハ淫<sup>ミルホリユム</sup> 蓮<sup>ミルホリユム</sup> 車<sup>ミルホリユム</sup>  
 前馬鹿<sup>ミルホリユム</sup> 鈴石<sup>ミルホリユム</sup> 菴<sup>ミルホリユム</sup> 且<sup>ミルホリユム</sup> 芸香<sup>ミルホリユム</sup> 紫蘇<sup>ミルホリユム</sup> 玫瑰<sup>ミルホリユム</sup> 花<sup>ミルホリユム</sup> 荜<sup>ミルホリユム</sup> 薢<sup>ミルホリユム</sup> 沒<sup>ミルホリユム</sup> 菜<sup>ミルホリユム</sup> 等ノ  
 煎湯<sup>ミルホリユム</sup> ラ<sup>ミルホリユム</sup> テス<sup>ミルホリユム</sup> ヘシ<sup>ミルホリユム</sup> 尚<sup>ミルホリユム</sup> 又<sup>ミルホリユム</sup> 其<sup>ミルホリユム</sup> 間<sup>ミルホリユム</sup> ニ<sup>ミルホリユム</sup> 小<sup>ミルホリユム</sup> 便<sup>ミルホリユム</sup> 通<sup>ミルホリユム</sup> 利<sup>ミルホリユム</sup> ノ<sup>ミルホリユム</sup> 劑<sup>ミルホリユム</sup> ラ<sup>ミルホリユム</sup> 用<sup>ミルホリユム</sup> ヲ<sup>ミルホリユム</sup> シ<sup>ミルホリユム</sup> 便<sup>ミルホリユム</sup> 子<sup>ミルホリユム</sup>  
 野麩<sup>ミルホリユム</sup> 葉<sup>ミルホリユム</sup> 白色<sup>ミルホリユム</sup> 蹄<sup>ミルホリユム</sup> 耳<sup>ミルホリユム</sup> 葉<sup>ミルホリユム</sup> 山野<sup>ミルホリユム</sup> 菊<sup>ミルホリユム</sup> 葉<sup>ミルホリユム</sup> 蘭<sup>ミルホリユム</sup> 芥<sup>ミルホリユム</sup> 葉<sup>ミルホリユム</sup>  
 ケル<sup>ミルホリユム</sup> ヘル<sup>ミルホリユム</sup> 葉<sup>ミルホリユム</sup> 各<sup>ミルホリユム</sup> 一<sup>ミルホリユム</sup> 握<sup>ミルホリユム</sup> 右<sup>ミルホリユム</sup> 水<sup>ミルホリユム</sup> 煎<sup>ミルホリユム</sup> 取<sup>ミルホリユム</sup> 百<sup>ミルホリユム</sup> 六<sup>ミルホリユム</sup> 十<sup>ミルホリユム</sup> 錢<sup>ミルホリユム</sup> 漉<sup>ミルホリユム</sup> 過<sup>ミルホリユム</sup> 子<sup>ミルホリユム</sup> 加<sup>ミルホリユム</sup> 之<sup>ミルホリユム</sup>  
 刺<sup>ミルホリユム</sup> 蝮<sup>ミルホリユム</sup> 石<sup>ミルホリユム</sup> 三<sup>ミルホリユム</sup> 錢<sup>ミルホリユム</sup> 五<sup>ミルホリユム</sup> 錢<sup>ミルホリユム</sup> キ<sup>ミルホリユム</sup> シ<sup>ミルホリユム</sup> ル<sup>ミルホリユム</sup> フ<sup>ミルホリユム</sup> ロ<sup>ミルホリユム</sup> プ<sup>ミルホリユム</sup> リ<sup>ミルホリユム</sup> タ<sup>ミルホリユム</sup> ス<sup>ミルホリユム</sup> ハ<sup>ミルホリユム</sup> ラ<sup>ミルホリユム</sup> セ<sup>ミルホリユム</sup> ル<sup>ミルホリユム</sup> シ<sup>ミルホリユム</sup> ニ<sup>ミルホリユム</sup> 錢<sup>ミルホリユム</sup>  
 右<sup>ミルホリユム</sup> 合<sup>ミルホリユム</sup> 為<sup>ミルホリユム</sup> 飲<sup>ミルホリユム</sup> 劑<sup>ミルホリユム</sup>  
 若<sup>ミルホリユム</sup> 懷<sup>ミルホリユム</sup> 泄<sup>ミルホリユム</sup> 陰<sup>ミルホリユム</sup> シ<sup>ミルホリユム</sup> 清<sup>ミルホリユム</sup> 淨<sup>ミルホリユム</sup> シ<sup>ミルホリユム</sup> タ<sup>ミルホリユム</sup> ハ<sup>ミルホリユム</sup> 宜<sup>ミルホリユム</sup> ク<sup>ミルホリユム</sup> 其<sup>ミルホリユム</sup> 瘡<sup>ミルホリユム</sup> 口<sup>ミルホリユム</sup> 及<sup>ミルホリユム</sup> 潰<sup>ミルホリユム</sup> 瘍<sup>ミルホリユム</sup> ラ<sup>ミルホリユム</sup> 愈<sup>ミルホリユム</sup> ス<sup>ミルホリユム</sup> ヘシ  
 便<sup>ミルホリユム</sup> 子<sup>ミルホリユム</sup> 飲<sup>ミルホリユム</sup> 料<sup>ミルホリユム</sup> ト<sup>ミルホリユム</sup> 為<sup>ミルホリユム</sup> シ<sup>ミルホリユム</sup> 及<sup>ミルホリユム</sup> 子<sup>ミルホリユム</sup> 宮<sup>ミルホリユム</sup> 水<sup>ミルホリユム</sup> 鏡<sup>ミルホリユム</sup> 法<sup>ミルホリユム</sup> ト<sup>ミルホリユム</sup> 為<sup>ミルホリユム</sup> ス<sup>ミルホリユム</sup> ニ<sup>ミルホリユム</sup> ウ<sup>ミルホリユム</sup> ア<sup>ミルホリユム</sup> ル<sup>ミルホリユム</sup> ウ<sup>ミルホリユム</sup> ル<sup>ミルホリユム</sup> ト<sup>ミルホリユム</sup> ル<sup>ミルホリユム</sup>  
 根<sup>ミルホリユム</sup> シ<sup>ミルホリユム</sup> タ<sup>ミルホリユム</sup> シ<sup>ミルホリユム</sup> ヘ<sup>ミルホリユム</sup> イ<sup>ミルホリユム</sup> ボ<sup>ミルホリユム</sup> シ<sup>ミルホリユム</sup> ス<sup>ミルホリユム</sup> テ<sup>ミルホリユム</sup> ス<sup>ミルホリユム</sup> ノ<sup>ミルホリユム</sup> 帝<sup>ミルホリユム</sup> カ<sup>ミルホリユム</sup> 而<sup>ミルホリユム</sup> 卷<sup>ミルホリユム</sup> 那<sup>ミルホリユム</sup> 定<sup>ミルホリユム</sup> 務<sup>ミルホリユム</sup> 密<sup>ミルホリユム</sup> 陀<sup>ミルホリユム</sup> 僧<sup>ミルホリユム</sup> 等<sup>ミルホリユム</sup> ラ<sup>ミルホリユム</sup>

五十七

以<sup>ミルホリユム</sup> テ<sup>ミルホリユム</sup> ス<sup>ミルホリユム</sup> ヘシ  
 又<sup>ミルホリユム</sup> 宜<sup>ミルホリユム</sup> ク<sup>ミルホリユム</sup> 概<sup>ミルホリユム</sup> ラ<sup>ミルホリユム</sup> 生<sup>ミルホリユム</sup> ス<sup>ミルホリユム</sup> ル<sup>ミルホリユム</sup> 食<sup>ミルホリユム</sup> 物<sup>ミルホリユム</sup> 飲<sup>ミルホリユム</sup> 料<sup>ミルホリユム</sup> ラ<sup>ミルホリユム</sup> 禁<sup>ミルホリユム</sup> ス<sup>ミルホリユム</sup> ヘシ 又<sup>ミルホリユム</sup> 多<sup>ミルホリユム</sup> ク<sup>ミルホリユム</sup> 勞<sup>ミルホリユム</sup> 勤<sup>ミルホリユム</sup> 心<sup>ミルホリユム</sup> ラ<sup>ミルホリユム</sup>  
 忌<sup>ミルホリユム</sup> ム



子宮硬結腫篇第九

大較

凡腫瘍ノ硬結スルハ或ハ強烈ノ劑即チ毒ヲ内伏潜  
固スル劑ニ由リ或ハ脉外溢留ノ血ニ由チ硬結ス此ヲ硬結腫  
ト名ク

証候

此二病ハニ硬結ノ腫瘍アリテ痛ナク又退移セズ月經不調或ハ  
通ナシ比塞方ク然レ其後時ニ大ニ崩血シ此ニ就チ步行スルニ  
重難ナリ

鬼胎 其物詳見 必ス氣房膨腫ス此硬結腫ハ甚ク細薄



ナリ

看法

此病甚多治スルニ艱ナリ何トハ患部ノ道路頭ニ見入難ク且ツ甚多術ヲ施シ難キ部分ナレバナリ○又経久ナルホトイヨク軟化消除シ難キナリ若此ニ醜石流ヲ夾ムハ瘻瘡トナラシムラ悲此又経固ヨリシテ動モスレハ水腫ヲ発スルナリ○此腫底ニアルヨリハ出口方ニ出レホトイヨク良トス

治例

腫内ニ包畜スル汚物ヲ解釈シ而メ消散スヘシ

子治法

五ノ七九

可多軟化融解スル莖葉及水鏡劑ヲ施スヘシ便チ後方ヲ良トス

白芎葵根 百合根 野薄荷根 各一匙 錦葵子

バルハシヤ 白芎葵子 一握 亜麻仁 胡芦巴仁 各

四匙 草聖陵菜花 半握

右水煎取百六十文濾過シ加之泊夫藍 五分 竜腦

ニ匙 右合

又外ヨリ貼スルバツプ及膏薬ノ類ハ若施サハ面徹シ難キ故ナリ然レモ子宮内ヨリ灌入スルニ巴且香油百合細等ヲ以テスヘシ此ヲ久ク子宮内ニ留ルヤウニ子宮腔門ヲ閉死シヨクシ又軟膏ヲ製シ濕シテ子宮ニ灌入スヘシ便チ其方



ゴム アムモアレン ナ六枚 牛酪 ニ十四枚 百合油  
ニ枚

右合為軟膏

又此の内服 蒸ハ宜ク 肝將硬 諸腫篇ニ要キルモノヲ用ユ便ナク  
ルタリス ロフトリヲラナス 云キストリ云 カレキビス 刺帖石  
リマキユラ カレキビスシテナリ

子七

子宮瘰癧篇第十

大較

瘰癧ヲ硬 諸腫アリ 然レ此劇痛 如刺ニテ 子宮ノ幾里見ニ  
至ル

証候

証候ハ前ノ篇ニ要ルルカシ 然レ此時々大劇痛ヲ至シ 其神經及膜  
甚々通徹スルニ至シ

痛因

水液ノ乳糜即鹹液ノ塩鹹ノ毒汁カ子宮中ノ幾里見ニ留結  
シ及此液カ他ノ諸部ヲ刺攻レ此ニ由テ膜カ其酸烈液ヲ以テ



少刺衝此ニ次ラ大痛ヲ發スルナリ此鹹味液醋房ナルヲ以テ

衛次ニ奄蝕腐爛スルニ至ル

又硬結腫ニ於テ鹹烈液浸ヲ增長スルキ此病ニ變スルナリ又子

宮ニノ數里兎ヲ毀傷スルナリ又此病ニ變ス其後液汁カ

通徹セズ留止スル寸ハ鹹烈毒ヲ生スルナリ

區別

酷房毒カ皮表ニ浸蝕スル寸ハ潰爛ス重ニアル寸ハ此ニ及ス

看法

子宮ニ蝕瘡アルハ危症トス大抵昔此毒作スル寸能ハス

治法

五ノ九

此病不治トイヘ此宜ク極和安腹ノ法方ヲ以テ日時ヲ延シテ

ハシ又大キクナラヌヤウニ防止スル此ニ由テ酸敗ノ鹹烈毒ヲ抑制シ

腐蝕ニ進ムヲ防止スル其方

醋 八丁 鈔丹 四十八 毒胆 四

右各為小銃劑或為茶葉或雜子黃、三廿蓋微水及鈔

白霜ヲ加ハ鈔白ヲヨリ研リ如上法用エ又疼痛劇キ

モハ止痛茶便チ阿陀洎走藍等ヲ用エシ

右劑尤良効アリ何トナレハ諸般ノ酸烈液ヲ頓挫劑仗蝕

腐潰破スルモハ宜ク清除スル劑ヲ用エシ則チ以上ノ劑河

蝦反或燒キ丸雜卵ヲ交ヘ反シテアルヒ云テリス



瘦不注

及及若ヲ和フ内服若ハ酸收ヲ制伏スルモノ即チ蝦右牡  
蛎コレヲ等ナリ

正ノ七ニ

子宮膨脹篇第十一

大較

子宮膨脹病ハ凡フ牽引ノ動ヲ發シテ腹脹シ婦人及處女ニテ三宛  
モ孕スルガ如シ

區別

此膨脹スル一ツハ子宮ニテリ一種ハ膜ニテリ○又子宮ノ水腫ト區  
別アリ何トナレハ此病ハ風寒ヲ致シ急速ニ奔來シ○又子宮ノ水腫ハ  
唯水或ハ粘液アルナリ

病因

此病因ハ吾前ノ鼓脹篇ニ準ル病因ノ如ク而メ加之臍肝腸間膜



等ニ患害アリテ急率引ラ為シ又外寒冷ヲ受ケ或ハ經閉或  
風ヲ生スルノ食物ヲ食ヒ或ハ月經来ルノ時寒水ナトニ浸リ  
或ハ産後子宮ニ醜厲液留止スル等ナリ

証候

鼓脹腹滿其部分高クシテ大ナリ此病ハ其部分低ク次脹ス○又子  
宮ヨリ時々風氣ヲ放泄ス子宮ノ空間ヨリ風氣ヲ泄セサルモノハ其  
患部腫ニ在リト知レヘシ○又子宮ニ水アル症ハ子宮室キヲ覽而  
ハ膨脹腹滿スルヲナシ○其膨脹スルヲ增長レ而メ疼ミ減スルモ  
ハ此病トス子宮水病ハ如此強甚ナラス

看法

ひノ一

殊膨脹久ク暫留セズ故ニ危フカラズ然レモ殊レカ腹中ニアリテ久ク  
休マサルモノハ動モスレハ水腫ニ変スルナリ

治法

治例及治法凡テ鼓脹ニ牽ル知シ○殊ニ孰テ亦子宮衝逆ニ用レテ  
ノ法ヲ施スベシ○又子宮ニ駐スルニ糠塩志村人參子ニ酒ヲ湿シ袋  
ニ入レ熱シテ貼スベシ○又砂及塩ニ糠ヲ加ヘ如上法施シテ良  
○又塗藥ト為スニ茴香油鴨菊油カストレ云茴藤油甘松油  
月桂油等良ナリ○而後温煖ニスル膏藥ヲ貼スヘシ使テ五今ヲ  
スレテキエシノテハツカラウリオシセロレ云等或ハハツブト  
為スニ牛尿酒糖枝活子胡安子ニ酒ヲ加ヘ煮テ製シ貼



スレシ○又直腸水銃法ヲ施シテ硬結、尿ノ腸中ニ在ルヲ通利シ共ニ由  
テ子宮ヲ壓迫スレシ毎時共硬尿ニ由テ大疼ヲ發スルモノナリ  
方ヨリテ子宮ニ灌入スレシ

苗香項種 鴨菊花 ラヘンデル花 各種 側柏葉 半握

茴香子 防風子 志村人參子 獨活子 各四錢

右水及酒各ニ百錢ヲ入テ煮以テ六十四錢ニシレ云 カステレニム

十六錢ヲ加ヘ合シ為子宮水銃劑

又丁子皮肉豆蔻ヲ燒テ煙ヲ薰シテ甚良ナリ

又凡ソ子宮ノ部分ニ角法ヲ施スレシ

い、ニ

子宮水腫篇第十二

大較

子宮水腫ハ稀ク或稠液カ子宮ニ發滿シテ膨大腫脹スルナリ

區別

粘稠汚液水液或ハ鹹液ヨリ来ル○又子宮ニアルモノアリ○又子宮  
ノ腔喇ハ管或ハ卵巢ニアルモノアリ

証候

宛モ子宮風脹ノ症ニ説クカ如シ然レモ草ナリ風葉ヲ池スルナリ  
ナリ但時々水ノ如キ液ヲ子宮ヨリ池スルナリ

病因



此病因ハ九テ腹水ニ説ク如シ○或ハ産厄ノ療術悪ク或ハ斑猫ヲ  
服シ或ハ寒冷ヲ受ケ或ハ熱病等ニ因テ起ルモノナリ

者法

埃水腫子宮ノ内空ニアルモノハ治シ易シ埃カ膜喇ハ管或ハ卵巣ニ  
アルモノハ治スニ難ナリ○其液酷厲或ハ腐敗スルモノハ險惡トス  
經久ナルモノハ埃ヨリ惡症ヲ發ス何トナレハ埃ニ由テ○子宮腐敗死肌  
脱疽ヲ生ズレハナリ

治法

埃懸テ腹水ノ治法ト同シ○又埃ニ子宮衝逆病ノ劑ヲ兼用スニ  
則チ驅泄ノ劑ハ側柏若薏艾卅蘭芥根芦根獨活子胡蘿服子

い/三

志村人參子没薬ニ椒石 マムモニアシ 杜松子 蓬砂

又小便通利劑及発汗劑甚タ良効アリ後方ヲ七日ニ二度ワ

同スニシ

蓬砂五分 洎夫藍二分五厘 側柏葉五分 右合為末

又子宮或ハ子宮口ヲ探リテ罔キ水ノ通泄スルヤウニスニシ又水ク其腫

ト同ニアルモノハ宜ク埃ヲ破決シ而後側柏野薊 サニケル卅石薄荷白

色鹿耳紫菀等ノ煎湯ノ子宮ニ注射スニシ○又苦薏煎ノ浴湯

尤良ナリ○又利尿管或ハ卵巣ニ水液ヲ包蓄シ外ヨリ通泄シ難キ

モノハ宜ク水液ヲ驅泄シ及稀薄ニシテ茶劑ヲ用ユニシ○然レ止ム

ヲ得サルモノハ下腹ヲ罔孔シテ水ヲ池スヨリ外ナシ



妊婦諸病篇第十三

看法

妊婦ノ諸病ハ凡テ他ノ人ヨリハ危クムニシ或ハ諸症ニ因リ或ハ茶劑ヲ  
 服スルニ由リテ動モスレハ墮胎シ易キナリ何トナレハ刺絡ヲ為スルニ此  
 處弱ナルモノハ胎子ノ養液ヲ脱去セシメテ恐ル塊養液ハ乳汁煉ノ  
 モノニシテ血中ヨリ輸養スルモノナリ○又下利セシムルニタケレ  
 ハ血及水液ヲ攪動シ其茶氣ヲ轉輸ニ由テ小児モ亦下利ヲ患  
 シ故ニ由テ搐搦ヲ養ス○又臍池刺モ害ナリ故ニ由テ諸液ヲ專ラ  
 多ク子宮へ陥池シ故ニ由テ胎衣ヲ弛緩シ陥下墜出スル起原ヲ為  
 ス○又其液カハ兒ノ包膜間ニ滲ク流陥レハ兒ヲ押迫スル至ル



治法

大抵治法ハ尋常ノ諸病ニ同シ然レモ慎ム意ヲ用テ斟酌スルニ  
 給強キ下劑既出通泄ノ劑ナリ殊ニ飲食養生ヲヨクスルヲ專要トス  
 又飲食ハ慎ムトイハレ格別寡食スル方ラス何トナレハ胎子カ養液ヲ受  
 ケレバナリ ○凡ソ食物乳糜ニ化ス乳糜ノ養物胎子ヲ養フ然レ  
 此受胎シテ初メノ間ハ飲食ヲ寡シテ食フレヨク消化スルヲ要トス  
 六ナリル後胎兒大キクナリル頃ハ多ク食シテ害ナレハ兒ヲ養ハナリ  
 又刺絡ニ殊ニ腹胎長シタル頃ニ為ス勿レ下劑ハ ヒツボクヲ年ス ノ脱ニ  
 四ヶ月ヨリ七ヶ月マテノ間ヲ可ナリトスト云然レモ昔按ニ凡テ強テ  
 下劑ハ禁スレモ此ニ由テ甚々和カナル劑ヲ良トス使テ季甘露蜜

ひノ子

タマリント 製酒石鹽乾蒲桃阿没勒糖等 ○又大使閉スルモノ宜  
 ヲ坐蒲及和カナル直腸水鏡法ヲ用エシ ○又発汗劑及小使通利  
 劑ハ用ルテ勿レ其トモ分量カク其フニ發汗茶ハ底野加ミトリグト  
 或ナキニシテ云テ用エシ



墮胎篇第十四

大較

此ハ胎子ヲ熟成セズ不月ニレテ脱出レ或ハ子宮内ニ死スルナリ

看法証候

惡寒、戦慄シ腰及膝重ク頭痛殊ニ眼ノ後ニ當テ疼ミ上腹及脈亭  
率レ乳房縮小ス○又驚怖等ノ一アリテ胎子急ニ運動シ血及水ヲ  
陰処ニ泄出シ疼痛シテ胎子ヲ脱出スル一アリ○丸腰、髀骨ノ辺ニ當  
テ痛ミ腎又横骨ニ通徹スモノナリ

前微

毎時波け流池レ凍痛ヲ發シ且ツ胎兒死スモノ、惡寒昏眩心悸動



我懷幸急製引惡臭ヲ殺シ或ハ壯熱寒熱及如此類

外因

前篇ニモ説クカカリ刺絡或以下利通尿利月經既出刺等由  
テ大池血ヲ為シ或ハ打撲撞突失墮盛怒驚恐悲哀惡飲食子  
宮ノ嫩腫腫瘍潰瘍池血等ナリ

看法

傷産本産ヨリハ危レト知レシ○又大崩血昏暈搗製子宮嫩腫  
危重ノ悲病胎子内懸レテ下ラズ或ハ其膜下ラス及胎子腐敗  
等ヲ察スル恐レキナリ○又虛弱瘦小ク患婦毎時衰弱シ且ツ  
道路使隘ノ患ヒアルナリ○又以患レソ六月及七八ヶ月頃ニ多

いし

クアルト知レシ

治例

最初ニ茶劑ヲ用テ墮胎をヲ防クシ○又胎子脱満スルノ症ハ宜  
ク適宜茶劑ニテ既出スレシ○終リニ於テハ諸症ヲ鎮靜スレシ

治法

惡液酷厲酸烈鹽液ヲ徐々ニ良液ニ復シ而メ和カナル下劑ヲ以テ既池  
ムシ然レモ墮胎崩血等ノナキヤウニ防慮スレシ○又子宮嫩腫腫  
瘍潰瘍等ハ治法前ノ第七編ニ於テ詳説ス○其病宜ク鎮靜ニシテ  
忿怒躁擾恐驚等ヲ禁ムレシ○又胎子ヲ既出セシト破産モノハ  
宜ク難産篇ノ茶劑ヲ用ユレシ



又スビリナス (イヌラリカニ篇ニ見ヘタリ或ハ スビリナス マトリカス  
見下ヲハ斐造蒲桃酒ニテ服スヘシ奇効アリ) 又腹痛及腰痛ヲ  
覺レモノハ諸テ塗擦ノ良劑ヲ撰用スヘシ ○又後方ヲ用テ此病  
ニ尢良トス

スビリナス マトリカリスノ方

乳香

没薬

琥珀

ヨリハスニ各等分

燒酒墮瓦

右合露滴ニ服度四錢ヨリハ斐ニ至ル

又疼痛眩暈昏弱心悸動等ノ諸症初卷大人諸病ノ諸編ニ於  
テ治療スヘシ 胎子出脱シタラハ丸ソ池血過多ナルモノハ宜ク閉正ス  
ヘシ尚又血ヲ清淨鎮止スルニ刺若石巴且香油等ヲ用ユヘシ

ひノハ

又強壯ニスルニ水糖ニ雞卵肉豆蔻肉豆脛桂等ヲ加ヘ共フヘシ



難産篇第十一

大較

此、也シ脱出セ又其間大疼痛或其他諸困難ノ症ヲ發ス

病因

此、身體及精力虚弱或、瘦瘠乾枯相処骨或、髌骨、形雙志、或  
硬結ノ大便及石等アリテ腸ヨリ壓迫シ或、阴莖ノ嫩腫膿瘍腫  
起及息同著アリ或ハ小兒ノ常ノ時節ヨリ早ク産出シ臨ニ或ハ  
胎或ハ子宮異常ニ大キク或ハ横居或ハ逆向ニ等ナリ○又毎  
時胎帯ノ小兒ノ頸ニ繫糾ニモアリ

首法



難産ハ危患トス母子ニ死スルヲアレハナリ四日ヲ過レハ大抵胎子死ス  
 又曾睡ヲ登レ或ハ搖榻ヲ登ルニ死症トス○噴嚏ヲ登ルハ良候トス  
 又ヒンボクヲテス曰ク妊婦月経ヲ泄通スルハ其胎子弱ク或ハ死スレト  
 ナリ然レハ告上毎度微スルニ孕婦月経アルモノ其兒壯強ナルヲ見ル其  
 因ヲ考ルニ師業ノ醗化有年過多或ハ胞衣ノ諸發見カ子宮中ニ  
 同着スルヲナキナリ

治例

難産ヲ為スノ所以ニテ求メテ治シ而ム出脱スルノ劑ヲ用ユニシ

茶劑

白芷根 馬兜鈴根  
 ムーエステルアル根 敗醬根 松浦 桂皮  
 ひノ十

月桂皮 薔蘿葉 艾葉 山鳥川葉 ケルル葉 ナクタムム ラウリユ  
 秋活葉 苦蕒葉 藿香葉 フリカニユ ポリユモ モンタナ  
 石薄荷葉 側柏葉ノ薔蘿花 洎夫藍 ラニチル花 苦蕒花  
 鴨菊花 フリガム花 杜松子 月桂子 蘭荷子 志村人參子  
 胡蘿服子 独活子 芸香子 芥子 胡瓜仁 没薬 ガルムン  
 阿膠 琥珀 蜈蚣 玳瑁石 己カ ヤントレウム 蓬砂 地連皮  
 アクワ イステリカ 杜松子油 萬年縷油 茴香油 橙皮油  
 琥珀油 帝々の面的那油 太陽並ノ洎夫藍 接骨木 側柏カニヒユム  
 等 スピリチス ムーエチルカ スピリチス マトリリ カイス ムーリチス  
 サビチ サル エラナレ フレラヤ



治法

胃ク直腸水鏡法ヲ施スニ宜後方  
胃酒<sup>ナ</sup>製 勿糖茶石<sup>酸ナ</sup> 側栝露瀉油<sup>各五</sup>

右合為水鏡劑

又腹部ニ蒸茶ト為レ施スニ側栝薛蘿艾葉苦薏 石薄荷  
蘭芥等 ○又肺ニ塗ルニ琥珀油或ハ香煙ヲ以テスニ ○又産道乾  
燥及狹隘ナルモノハ塗ルニ可且香油ヲ以テスニ ○又煙州ノ臭ニ吹テ  
嚏セムニ又後方ヲ用ユニ

ナククニ云葉 松浦桂<sup>各五分</sup> 洎夫藍<sup>五分</sup>ニ没菜錠  
蓬砂<sup>各五分</sup> 琥珀<sup>四分</sup> 右合為末

ハノエ

又スビリナヌ (イムテリク) 及 スビリナヌ ロトリカリス 甚初アリ

又横居或逆向スルモノハ産婆宜ク手術シテ復正スニ若シ正居ニ復  
スルコトヲ得セルモノハ宜ク切斷レ出スニ何トナレハ母体ヲ救フコトヲ得ル  
ハナリ ○又胎死スルモノハ宜ク引出スノ法吾外科書ニ詳ニス ○又婦人  
ノ腎ヲ高ク揚レハ小兒ノ通道廣クナリテ出脱シ易シ  
又マント<sup>各五分</sup> 奈<sup>五分</sup>ヲ身ニ佩ビテ大効アリト然レモ吾信用セズ  
又後方ノ催生茶ヲ用ユニ其方

桂 没菜錠<sup>見ニ</sup> 洎夫藍<sup>各五分</sup>

右為末以好酒服之

或ハ馬兜鈴 没菜胡椒及洎夫藍各五分ヲ用ユニ



或ハ エキヌタラクト ノ洎大藍ヲ三分ニ用テシ ○又桂油ニ滴ヲ加ヘテ  
尤ヨク強壯ニシ及強ク催生又 ○又琥珀ヲ用テシ尤良茅トス ○又免  
足骨ヲ搗テ リシ酒ニテ服ス甚効アリ 然レハ強キ茶ニ非ス ○又蓬  
砂三分ニ用ニヤク側指及洎大藍ヲ加ヘ服ス母時的効アリ ○又人或馬  
牛等ノ臍帶ノ乾シタルヲ服シテ良効アリ  
千六百七十九年ノ夏一婦人十四日同死胎下ラス吾草ニスビリナス  
マトリカリス見止ヲ内服セシムル由テ脱出シタリ數日過テ吾方ニ  
未快全ノ幸ヲ謝シタリ

ひノナニ

死胎出脱篇第十六

大較

産道狹隘小兒度ニ過テ大キク或ハ虚弱疾病ナルモノ足ヲ出シ或ハ  
横唇レテキヲ出ス等ノモノハ胎子動モスレハ死レ而シテ出脱シ難キナリ

証候

其母或ハ産婆ヲ以テ試ルニ以前ヨリ胎兒ノ運動止ミ腹重ク疼  
痛ヲ加ヘ子宮微熱(蕩搖スルヤウニ覺)腹冷且ツ振慄シ惡臭ノ汚  
汁ヲ池流シ面色及唇淡紫色四支及乳甲寒冷青色等ナリ

看法

之ヲ持長スレハ厄シ然レハ辨朗社王ノ官匠瘍科ノツツカス



記載スルハ小児ガ二十五羊ノ間母ノ腹中ニイリント如女久腹中ニ居ル  
多シ

治例

最初ニ宜ク駢出方劑ノ行フニ若シ埃ニテ出スル宜ク療具ニテ引出  
スレ

治法

催生茶ハ吾前篇ニ記ス宜ク採用スレ○又時々後方ヲ一裁ヲ用ユレ

洎夫藍考 沒茶 蓬砂各三分厘 馬兜鈴根一錢 側柏

ナクタクニエス ケレシ州名各ニ變 右合為細末

又萎茶ヲ腹部ニ施スニ使キ馬兜鈴野蒲桃根泥菖根 志村人參

ハノオニ

苗香等ナリ○又子宮水鏡法ト為スニ上ニ云如キ類ノ劑ニ牛膽ヲ

加ヘ施シテ尤知アリ○又附門坐茶ト為スニガルブム 藜芦若瓜

亭牛膏鹽 牛膽 竜骨 木脂 等ヲ以テス○又浴湯法ト為シ施スニ

レ○マウ花スノ説ニ六厘六毛或ハ厘三毛ノ メリクリアリス 七タ工 見附録

ヲ内服セシメテ 敷度大初ヲ得タリト 何トナレハ吐ヲ為スニ由テ腹

部大ニ壓迫シ胎児ヲ押出ナリ○又嚏ヲ登セシムルモ良トス

又諸方法ヲ尽シテ知ラ成サスハ宜ク外科法ノ療具ヲ以テ術ヲ施

スレ 此書外科書ニ撰述ス



胞衣不下篇第十七

大難

胞衣初下ハ子宮ニ緊着シ故ニ由テ大ナル諸症ヲ發シ或ハ死ニ至ル者アリ

病因

若シ胞衣大ナルカ或ハ子宮内ニ固着不離ナルカ或ハ子宮ニ癰腫及腫脹シ易子宮ノ口速ニ窄閉スルモノ或ハ潤滑ノ液ヲ多ク脱去スルヲ以テ甚シク乾燥シ或ハ産婆切者ナラズ粗暴ノ術ヲ施シ或ハ胞衣ヲ引出スニ手粗クスルニ由テ内ニ懸留ス 或ハ寒冷気患臭氣或ハ強キ勞苦若シ氣等ニ受ルテ凡テ婦人常度ノ運行ヲ失シ或ハ

いんち



婦人精ヲ衰弱シ或ハ恐怖驚駭眩暈急怒等ニ由テ或ハ胎兒ノ  
重キニ由テ臍帶カ臍ヨリ脱ス胞衣懸留スルモノアリ

証候

証候知り易シ則チ產婆乃傍者者氣ヲ付テ見ルニ全胞衣或ハ  
胞衣ノ一分片カ中ニ留ルナリ

看法

殊ヨリ危キニ至ルト知レシ 吾一婦人ヲ見ルニ圓ル一年時摩ニ在リテ  
所ニ内伏背蓋熱ヲ發シ其内ニモ時々發作アリ  
食不進眩暈常ニ子宮一向テ動カスアリ其婦人終ニ死ニ歸シ  
タリ 又此病ノ諸症ヲ見ルニ池汗振慄子宮抽製膿汁ヲ出シ

ハノナキ

痲病不断疼痛腐敗惡臭等アリ

治法

某劑ハ前篇ノ死胎ヲ取出スルノ方法ヲ用ニシ 尚又取出スルノ其  
劑ハ エビリキス (イヌテリカ) エビリキスマトリカリス 杜松子油  
喇括石 独活子 志村人參子 生葱ニ食ヒ或ハメリタリアクス  
ヒタエ 附録ノ吐茶或ハ嘔某子宮水銃法等ナリ



産血過崩篇第十八

病因

或ハ胞衣ヲ急ニ引出シ或ハ産婆ノ手術悪キ等ニ由テ崩血  
過度ヲ為ス

証候

悪心脈腹疼シ腹脹リ脈微弱眩暈耳鳴搐搦又火極七八九日ニ産  
血アリ或ハ紫ロリ又キミアリ是ニ就テ水ノ如キ液及膿汁ヲ通泄スナリ

者法

殊危ハ危キヲ無キニ非ス或ハ死ニ至レテ多シニ搐搦シ昏暈ニ令汁  
ヲ漏泄スルハ死徴トス



治法

宜ク快ヲ急ニ閉止スルヲ勿レ何トナシハ瘀血ヲシテ内ニ停留セシメ  
サレカクメナリ故ニ毎ニ微ク閉流シノ劑ヨリ初ムニ強ク一頓ニスルヲ  
勿レ 珍陀酒甚良ナリ尚又崩漏漏諸方茶ヲ撰用スニ  
又睡<sup>ヒ</sup>過<sup>ヒ</sup>多<sup>ク</sup>ナラシムヘカラス死血ヲ生スルナリ ○又凝結ノ血子宮ニ墜  
着スルモノハ宜ク子宮水鏡劑ヲ施シ或ハ和カナル疑劑ヲ用テ滌清  
スニシ ○又若シ毒婦ノ精カ耐ル<sup>ル</sup>ヲ得ハ家内ヲ步行シ或ハ步行ス  
ル<sup>ル</sup>ヲ得サレハ立ツヘシ ○又、高ク坐シテ汚池ノモノヲ下降セシム  
然レハ丸ヲ捺々ニ瓦ヲツケ慎ムニ勤ムスレハ又再々新血ヲ爲  
ムナリ

いノ十七

産血閉留篇第十九

大較

産後惡露通泄セズ由テ速ニ此病尙敗惡良嫩腫腫起等ヲ  
継發ス

病因

血ヲ凝結或ハ子宮口早ク閉塞シ或ハ寒冷ヲ受ケ或ハ足ヲ冷ヤシ或寒  
冷ノモノヲ服飲シ或ハ悲哀恐懼驚駭等ヨリ發ス

証候

振慄惡寒發熱眩暈腹痛支節麻痺等 寒暖脹リ顔面赤  
眼目異常等ナリ



着法

此病危キ一無ニ非ス何トナレハ久クナレハ腐壞シ而メ死スルナリ

治例

軍ノ瘀血ヲ駆出シ子宮ヲ清除シ而メ血ヲ稀薄ニスレシ

治法

瘀血ヲ駆出スルノ劑吾經閉絡ニ攀ルカ如シ耳ク採用スレシ○又子宮水銃劑ヲ施シテ清掃スレシ又豆脚ヲ摩循シ旨角ヲ鼠鼯及胎ニ施シ○又腹所ニ軟化融解スルノ莖菜ヲ施シ又水銃法薑煙法坐茶等等適宜ニ採用スレシ而メ駆出茶劑ヲ内服セシメ及適宜ノ飲食養生ヲ守ルレシ

ひノ十八

兎枕痛篇第二

大較

産後腹痛アルナリ常ニ居多ナリ然レ比ニ三日許モ少シクアルハ格別異ムニ  
且ラス但大疼痛休マサルモノ以テ方法ヲ施シ救フヘシ

病因

或ハ痛留ノ血鹹液水液等々其酷厲ニ由テ刺衝シ○或ハ母腹以前ハ甚ク強ク膨脹シタルモノカ今ニシテ産後其細絡鐵筋及膜カ急ニ牽縮シ此ニ由テ腸腸同腹等ニ再ヒ弛懸シテ常度ノ運行ヲ失フヨリ起ル○又腸痛病寒冷風氣痞帶等ヨリス

着法



殊病危フムシ勦モスレハ甚ク退キ難ク頑強ナルモノアリ

治例

子宮中ニ懸雷スル汚血液ヲ取出シ清除スレシ

治法

眞ヲ帶ヲ以テ腹ヲシツカト縛スレシ塊ニ由テ腸及腸間膜カ弛緩空  
用ヤスヨク收容スルナリ ○而後凡テ和緩スルニ新壓ヲ巴且香油ヲハ  
シシ酒ヲ加テ服スレシ ○又温煖ニスル直腸水銃劑ヲ施スレシ毎時良  
効アリ或ハ塊ニ由テ硬屎ヲ通シテ緩解スルナリ ○又温煖ニスル莖菜或  
ハ熱砂ニ蓋ヲ加ヘ或ハ塗茶膏茶類ヲ外用スレシ ○又ハツフト為ス  
葱芥子 馬兜鈴 鴨菊 月桂子 芥子 以テシ脂スレシ甚ク良 ○又

ハ十九

焼酒造ノ糟ニ甚良或ハ塗ルニ後方ヲ以テスレシ

芸香油

茴香油 各ナク

月桂油 ハキ

芥子

生姜 各四葉

右合

又芥子胡蘿蔔服子酒ニテ服ス或ハ酒雜印桂肉豆蔻膜砂糖  
等ヲ合シ用エ ○又腸癰病及腸間膜痛ニ琴ル茶劑ヲ用エシ



乳根篇第二十一

大較

乳熱ハ血ヲ稠結スルナリ産出ノ日ヨリ凡ソ三四日ニシテ終ス

証候

發熱煩渴煩躁腰痛肩胛痛乳房脹滿ス

看法

若シ乳汁ヲ早ク吸出サレハ動ススレハ疑固シ○嫩腫潰瘍乳癰ヲ  
生ス或ハ又性未熟病ニ變スルナリ

病因

若シ乳房數日見乳汁充滿シ乳房脹滿シ米ニ由テ血ガ常度ノ如ク

運行たう能ハス何トナレハ幾里見ノ壓迫スルニ由テ他道ニ押入レ其ニ  
 由テ血カ通利スルヲ得ヌ其ニ留止シ諸症ヲ變出ニ又其レカ漸々ニ他  
 血道ニ流溢シ惡性トナリテ熱ヲ發シ其ニ執テ諸症ヲ發ス  
 然レ其最初乳房ニアルノミテ起發スルモノハ其熱少日ノ内ニ解散ス  
 又乳汁様ノモノカ子宮ニ滯溜シ而メ乳房ニ行キ而メ血中ニ留リテ  
 相結シ而メ熱蒸スルモノハ諸症ニ變スルナリ

治法

其ハ輕病ナリ宜ク淡治ノ飲食ヲ禁ヘ脂厚鹽鹹辛味ノモノヲ禁ヌ  
 一シ又常ニ乳汁ヲ絞リ出スニシ○又宜ク初日ニミテ膏ヲ以テ覆  
 フニシ其ニ由ラ乳汁ノ洪溢スルヲ防ズ○然レ其乳汁膏ヲモノハ其

〇ノ七一

ヲ禁ヌ



產婦熱病篇第二十二

大較

熱病ノ証候者法等ハ初巻諸熱病篇ニ詳説ス

病因

或ハ稠濃ノ血アリテ凝レキ辭沸シテ熱ヲ生スルノ前ノ諸篇ニ論ス  
ルカ如シ故ニ産血惡露ノ閉塞ニ由リ或ハ胞衣久ク不下ニ因リ或惡  
キ食物或ハ寒氣ヲ受ケ或ハ勞動ニ由リ或ハ大便閉塞或ハ急  
怒悲憂等ニ用ル○則チ産血流通セズ或ハ胞衣不下ノアルノ後チ  
子宮傍側ノ部分積聚シ凝ニ由テ微腫 而シテ熱生シテ尚又  
産時ノ取扱ヒ惡キニ因テ然ルモノアリ○惡キ飲食ヨリ起ルヲアリ

トハ重厚ノ麦酒ヲ飲ミ或ハ脂厚ノ肉ヲ食ヒ或ハカンテール酒及  
酸物ヲ食スル等ナリ○寒氣ヲ受ルトハ身体表發ノ蒸發氣ヲ凝  
寒シ埃カ内部ニ滯留シテ血ヲシテ沸蒸セシム○労働ヲ起ル所以ハ  
大ナル労働スレハ血ノ運行急速ナラシメ而メ温暖ヲ生ス

治法

大抵治法他ノ熱病ト異ナルヲナシ又格別多血ナルモノニ非レハ刺絡ス  
ル勿レ又食物ハ厚味ノモノヲ禁スヘシ○又和カニ通刺スルノ使ナ甘  
露蜜李乾蒲桃等ヲ用ユヘシ又アツテルスコロイト鹿角金盞  
花等ノ煎劑ヲ用ヒ又多血或ハ産血寡キモノハ灸法ヲ施シ及発泡  
薬ヲ貼スヘシウイリス称用ス洧夫藍ニ厚六毛ノラウメヌム

〇ノ世三

ラッロアトムヲ加ヘ用ユ吾經験シテ毎時良効ヲ得○又其間後方ヲ用ユヘシ

石薄荷精 艾叶水 蘭菊水 合テん アクワ ハ製

洧夫藍 葉 アストレム 三分三厘

右合時々一匕或ニ匕ヲ用ユヘシ

又発汗劑也知アリ○若シ腹痛病或ハ喉風等ヲ兼ルモノハ刺絡スル  
ト勿レ但多ク発汗劑ヲ用ユヘシ



乳汁不足篇第三十三

起原

若シ幾里見破ク附着スルトキハ乳汁ヲ幾里見受ルナレ或ハ血ヲ稠厚  
ナルトキハ參全ルナシ○或ハ幾里見カ縮小或ハ乳糜寡少或ハ婦  
ノ精水寡少ナルモノ等ナリ

治法

適宜好良ノ飲食ヲ與ヒヨリ良ナルハナシ○而メ乳汁ヲ生スルノ菜  
劑ヲ用テシ其諸菜ハ白芍藥根 マリトシチヌレル根 薛荔根  
蘭苻根 父チケケン根 蔣薺葉 茴香葉 イスハラキ葉 苜蓿葉  
葉 ヌルル草 ホレイカレ葉 高苜葉 蘭苻葉 ハリ云葉

ハレ

接骨木花 鴨 菊花 茴香子 蒔蘿子 鼠尾椰子 三ノル子  
 防風子 面瓜仁 甜瓜仁 乳仁 胡瓜仁 蒿苳子 甘巴且香  
 肉豆蔻 松子米 大麦 眉見<sup>イニミ</sup> 牛酪 雜印 蛭 蚘 燒酒 等 凡テ肉  
 服外用 或ハ食物ニ交ヘ用ユヘシ  
 又時々後方ノ散 著ヲ用ユヘシ  
 蒔蘿子 茴香 各<sup>各</sup> 水晶末 蘇合香 各<sup>各</sup>ニ  
 右合為散 某服量一梨  
 蒔蘿子 茴香子<sup>子</sup> 乳汁ヲ生ス又食時ニ少シク 茴香 燒酒ヲ用ユヘシ  
 シ異常ノ切イリ ○又乳房ヲ時々ニ手摩シ或ハ後方ノバツプヲ  
 貼スヘシ

ひノ七子

垂麻仁粉 芥子 パスナケニ子 百合油 各十六錢  
 右合為バツプ



乳汁過溢篇第二十四

起原

吾詳ニ前篇ニ擧ル起原ト相反スルモノナリト知ルヘシ

治法

眞ク食飲ヲ浚泊ニシ飲物ヲサクエシ○吾共ニ的効ヲ得ルナク  
鉛屑或ハ錫屑ヲ服スナリ○又外布スルニコメリン膏或ニミテ膏  
良ナリ或ハ乳汁ヲ吸出スヘシ舌ヲサレハ凝結シ瘡瘍トナル此膏外  
科書ニ詳記ス○又ニシクエント  
アルラロニ鯨精ヲ加ヘ貼シテ甚効アリ

悪性乳汁第廿五

大較

乳汁悪性ト云其色味及稀稠カ常ノ如クナラザルニナリ 則チ乳汁  
ハ白色ニシテ微ニ青色ノ帯ルモノナリ 其カ然ラスレテ甚々青ク或ハ甚  
々白ク或ハ黄色ナルハ宜シカラズ  
味ハ甘キヲ良トス 或ハ鹹或ハ苦或シテ酸及至他ノ異味アルハ不良トス  
又過稠ナラズ過稀ナラザルヲ良トス

包原

甚々青色ニ過ルモノハ汚穢重滞ノ血アルノ徴ナリ 其ニ由テ乳汁ヲ  
深浸シテ如埃ニ至ル ○甚々白ニ過ルモノハ乳汁ニ粘液汚汁化糞

ハノセテ



ルモノヲ火ルガユナリ黄色ナルモノハ過多ノ黄色ナル粘液中ニアリテ  
 而ノ甚シキ酸液ヲ更難シ以テヨク分利シ除クヲ能ス血中ニ留滞シテ  
 乳糜所謂乳汁ニ浸係シ以テ黄色ヲ現ス○或ハ此ヲ血中ヨリ分利シ  
 テ腸中ニ池留シ而ノ再ニ増加溢シテ乳糜中ニ更ルトキハ乳汁ノ  
 味苦キヲ現ス○酸味乳汁ハ酸味ノ液ヨク分利シ去ルヲ能ハス或ハ酸  
 塩ノ食ヲ過用シ而テ稀淡ノ飲料ヲ服スルヲ寡キモノヨリ起ル○吾等  
 時徴スルニ大ヲ解割シテ乳糜管ニ多クノ塩アルモノヲ見ル  
 又若味ヲ為スモノハ胆汁カ腸中ヨリ乳糜ニ交リ此ヲ程好ク大幾里  
 見汁ヲ調停抑制スルヲ不旦ナレハ液道ヨリ上升スルナリ  
 又流味ナルモノハ硫黄鹽様及殺虫病様ノ血アリテ交リ○或ハ

ハナリ

流味食物ニ由リ或ハ鴨鴈ナトヲ食フニ由ル○乳汁酸味ヲナスモノ  
 過食シ或ハ夥ク酸味ノモノヲ食ヒ或ハ乳汁カ久ク乳房ニ留シ  
 以テ乾酥様ニ変シ易キナリ甚々稠凝ナルモノハ胃寒傷冷以テ  
 稠厚ナル水液ニ乳糜液ヲ加ヘ或ハ稀淡ノ諸飲ヲ服スルヲ寡ク  
 或ハ稠<sup>粘</sup>稠ノ食物ヲ食ヒ或ハ幾里見カ硬結シテ乳糜ヲヨク分利濾  
 出スルヲ能ハサルナリ

過ク稀キモノハ飲料ヲ過シ或ハ液汁多キ食物ヲ食ヒ或ハ幾里見  
 ニ柔軟ニシテ膏ニ稠厚ノミナラヌ尚稀キ乳汁ヲ皆能ク引受  
 ハナリ

治例

悪液汁ヲ宜ク脱泄シ而メ性良適宜ノ食養ヲ施ムヘシ

治法

青色或黄色ヲ帯ルモノハ宜ク病因ニ就テ適宜ノ茶劑ヲ用テ其惡液ヲ泄除シ或ハ抑制スヘシ○又黒液ニ抑制スルニタルタリヌヒツトリララナ及諸般ノ風化揮発ノ精劑及鹽劑ヲ用ユヘシ又胆汁洪溢スルヲ去ルニハ淨製シタル丹荅或ハヒツトリナルマルナヌヲ用ユヘシ白色乳汁ハ宜ク粘液留飲ヲ脱泄スル茶劑ヲ以テ適クシ而後補復スルニ香竈ノモノ及風化揮発ノ鹽茶ヲ用ユヘシ苦味乳汁ハ宜ク胆汁ヲ脱泄スル茶劑ヲ以テ復スヘシ○鹽鹹味ナルモノハ宜ク尿水ノ下劑ヲ用ヒ及柔湯ヲ飲ムヘシ○稠乳汁ハ宜

〇ノセ九

ク飲料ヲ多クシテ飲ヲ稀クスヘシ而メ三ノ香竈様ノ風化鹽ヲ用ユヘシ○稀乳ハ宜ク養食ヲ以テ補ヒ而メ諸飲ヲ寡クスヘシ



